

& CHOISIR & DÉCIDER

Préconisations régionales 2016



**Maïs
Variétés
et interventions**

Alsace



ARVALIS
Institut du végétal

Avant-propos

Le présent document fait partie de notre collection « Choisir & décider – Préconisations régionales ».

Pour chaque espèce, notre gamme « Choisir & Décider » a évolué en 2014. Pour le maïs, deux types de documents vous sont aujourd'hui proposés :

- **Un guide de préconisations régionales pour 2016**

Il reprend les principaux résultats et les conclusions utiles pour le producteur en termes de variétés, de désherbage et de lutte contre les ravageurs. Vous y trouverez nos préconisations pour la région.

Il sera téléchargeable gratuitement sur notre site.



Ce document est rédigé par l'équipe ARVALIS – Institut du végétal de la région Est avec le concours des spécialistes d'ARVALIS – Institut du végétal.

Retrouvez également les « CHOISIR & DECIDER – Préconisations régionales » des autres régions en téléchargement gratuit sur www.arvalis-infos.fr.

- **Un document national « Choisir & décider – Maïs - Synthèse nationale »** regroupant toutes nos synthèses d'essais au niveau national sur les thèmes des variétés, de la protection des cultures et de la fertilisation, sera disponible en début d'année.

Il sera téléchargeable gratuitement sur notre site.



Un grand merci aux agriculteurs qui ont accueilli nos expérimentations ainsi qu'aux nombreux organismes partenaires dont les Chambres d'Agriculture, les Lycées Agricoles et les Organismes Economiques. Merci également aux sociétés de l'agrofourniture (semences et produits phytosanitaires) qui nous ont confié des produits à tester.

Equipe Régionale Alsace

Didier LASSERRE
Joanne BELLICAM
Thomas MUNSCH - Lucile PLIGOT

*11, rue Jean Mermoz – 68127 Sainte Croix en plaine
Tel : 03 89 22 28 40 – ou 01 64 99 24 72*



Email : j.bellicam@arvalisinstitutduvegetal.fr



SOMMAIRE



Bilan campagne 2015 - ALSACE	2
VARIETES DE MAIS	6
Evaluation des variétés	7
Le réseau de post-inscription arvalis-ufs maïs	7
VARIETES DE MAIS-GRAIN	8
Choix de variétés de maïs-grain très précoces – S10	10
Variétés de maïs-grain précoces S11	13
Variétés de maïs-grain demi-précoces S12	17
Variétés de maïs-grain demi-précoces dentées S13	21
Variétés de maïs-grain demi-tardives S14	25
Variétés de maïs-grain tardives S15	29
Variétés de maïs-grain très tardives S16	33
CHOIX DES VARIETES DE MAIS GRAIN POUR 2016 DANS LE GRAND EST	35
VARIETES DE MAIS-FOURRAGE	36
Variétés précoces Série SB	37
Variétés demi-précoces Série SC	40
Variétés demi-précoces à demi-tardives Série SD	43
Valoriser les maïs affectés par la sécheresse de l'été 2015	46
FUSARIOSE DE L'EPI	48
Synthèse pluriannuelle des notations de fusarium graminearum	49
Actualisation des références sur les variétés	49
Traitement statistique des données et présentation des résultats	50
DESHERBAGE	53
Lutte contre les mauvaises herbes	54
Désherbage 2015 : avantage aux racinaires	54
Compléments d'information sur les produits	54
Réseau desherbage region est	56
Les stratégies désherbage du maïs	59
Exemple de programmes (liste non exhaustive) « prix indicatifs »	59
RAVAGEURS	64
Protection contre les ravageurs	65
Protection des semis	65
Les captures de chrysomèles du maïs demeurent limitées en 2015	68

Bilan campagne 2015 – Alsace

ALSACE			
	Semis à 8-10 Feuilles	Panicules visibles à stade limite d'avortement des grains	Remplissage - Maturité
CLIMAT	Préparation des sols dans de bonnes conditions Hiver favorable à la structuration des sols. Temps sec fin mars favorable au ressuyage et aux préparations des terres. Semis assez précoces : la plupart des semis sont réalisés mi-avril. Retour des pluies à la fin du mois, favorable aux levées et à l'activité des herbicides racinaires.	Un été caniculaire, chaud et sec La demande climatique est extrêmement forte du 15 juin au 15 août. Les ETP sont parmi les plus élevées des dernières années et l'absence de pluie est remarquable. Le déficit hydrique (pluies – ETM) est fort. Certains secteurs s'en sortent un peu mieux avec des orages localisés mais intenses qui sauvent la saison (exemple de 45 mm sur Rouffach le 31 juillet). L'irrigation commence tôt et se termine de mi-août à fin-août soit par raison, soit par épuisement des irrigants (jusqu'à 11 tours d'eau)	Un automne favorable. Après un petit retour des pluies fin août – début septembre, un temps sec s'installe et permet aux chantiers de récolte de se dérouler lentement mais sûrement tout au long du mois d'octobre.
PHYSIOLOGIE	Début de cycle assez lent Les températures fraîches de début mai ralentissent fortement la croissance des plantes, en particulier dans les sols froids. L'excès de pluie du début du mois (100 mm vers le 1^{er} mai) empêche un développement racinaire optimal, ce qui aura des conséquences par la suite vis-à-vis du déficit hydrique. Une croissance sans excès, accentuée par les stress hydriques, qui se traduit par la mise en place de petits gabarits (entre-nœuds très courts)	Floraisons précoces : dès le début juillet Les fortes températures de début juillet (> 36°) laissent craindre des soucis de fécondation. Le phénomène est réel lorsqu'il est accompagné d'un stress hydrique (ralentissement de la croissance des soies et perte de viabilité du pollen). Ce n'est pas le cas en situations irriguées et dans la plupart des sols profonds, à bonne réserve en eau de la région, qui tiennent encore à ce moment là.	Evolution des pmg et de la dessiccation des grains Les dernières pluies sont favorables au remplissage des grains, (moins nombreux dans les situations stressées.) Les pmg sont corrects et « sauvent » en partie quelques situations (Piémont, Sundgau...) On note une évolution rapide de la maturité avec une constante d'environ 4 points par semaine durant une longue période. Les teneurs en eau à la récolte sont très faibles (20 à 25 % le plus souvent). Si le rendement régional est en retrait d'environ 20 q/ha, avec une moyenne de l'ordre de 95 q/ha, le grand écart est de mise avec du 45 q/ha (voire moins et beaucoup moins) jusqu'à 160 q/ha en irrigué.
BILAN SANITAIRE	Ravageurs : Attaques de taupins signalées par endroit en raison du ralentissement de la croissance et du temps humide. Dégâts de corbeaux toujours présents. Désherbage sans trop de souci : Réussite des interventions de pré levée, plus difficile en post à cause des conditions climatiques et de la croissance des adventices. Gestion du lisier correcte dans l'ensemble.	Pression pyrale assez modérée Les vols de pyrales sont bloqués par le temps chaud et sec de fin juin. L'insecte préfère pondre dans un environnement humide favorable à la survie des œufs. Pas de symptômes de maladies du feuillage.	Bonne qualité sanitaire Fusarium graminearum ne s'est pas manifesté cette année (temps sec à la floraison). On peut voir par endroit le développement de champignon de la section liséola sur les attaques de pyrale sur épi. Le dessèchement rapide des plantes en fin de cycle est accentué par la faible développement racinaire et la présence de coup de feu fusarien.







VARIETES DE MAIS

Evaluation des variétés

LE RESEAU DE POST-INSCRIPTION ARVALIS-UFS MAÏS

Chaque année de nouvelles variétés de maïs inscrites au catalogue officiel français sont proposées en maïs grain et fourrage aux agriculteurs et distributeurs. Les variétés du catalogue européen qui se développent largement ou qui réussissent avec succès les épreuves probatoires au réseau de Post-Inscription élargissent l'offre. Ces nouvelles variétés sont comparées sur les principaux critères de choix de variétés dans un réseau d'essais qui couvre les différentes zones de culture.

Objectifs du réseau de post-inscription

Le réseau d'essais variétés Post-Inscription maïs grain et fourrage a pour objectifs de :

- préciser et comparer les caractéristiques agronomiques de précocité, de rendement, de tenue de tige, tolérance à l'helminthosporiose et de valeur énergétique en fourrage des nouvelles variétés développées en France, ou susceptibles de l'être, en maïs grain et fourrage. La comparaison s'effectue avec des variétés de référence et entre hybrides,
- compléter et confirmer durant une à trois années successives, dans les différentes zones agroclimatiques auxquelles les variétés sont destinées, les références acquises antérieurement, lors des épreuves CTPS en vue de leur inscription au journal officiel ou lors de leur expérimentation en épreuves « probatoires »,

Organisation et réalisation des essais

L'expérimentation est réalisée par série de précocité. Les variétés de 11 groupes, dont 7 en maïs grain et 4 en maïs fourrage, sont testées à l'aide d'essais répartis dans les différentes zones agroclimatiques qui caractérisent les conditions de culture du maïs en France.

La définition des listes variétales et des lieux d'essais, l'acquisition des données et la validation des résultats suivent un protocole et des modes opératoires communs, définis à l'échelle nationale par les représentants des différents partenaires du réseau (Commission Mixte ARVALIS - Institut du végétal et UFS –Section Maïs). Ces documents sont diffusés aux acteurs et expérimentateurs via un Extranet. L'organisation, les procédures de travail, l'évolution des règles, la logistique, l'analyse des résultats et leur synthèse et diffusion sont gérées par ARVALIS – Institut du végétal. La conception et la mise en œuvre des différents processus du fonctionnement du réseau de Post-Inscription et de l'élaboration des références sont décrites dans un référentiel agronomique et des comptes rendus de réunions.


Variétés expérimentées

L'expérimentation de « Post-inscription » concerne les nouvelles variétés :

- **inscrites au catalogue officiel français** dans les différents groupes de précocité en maïs grain et en maïs fourrage. Les nouvelles variétés inscrites dans l'année qui ne sont pas testées ont été retirées de l'expérimentation par les obtenteurs pour des raisons de non disponibilité en semences, de non commercialisation immédiate ou bien de listes surnuméraires. Les établissements de semences ont aussi exceptionnellement la possibilité de retirer de la publication avant le 15 août des variétés qui présentent des insuffisances de qualité de semences. Ces hybrides gardent la possibilité d'être expérimentés l'année suivante en 1^{ère} année.
 - **ayant satisfait avec succès des épreuves d'essais**
 - **« probatoires » au réseau de post-inscription.** Ce type d'épreuves concerne des variétés qui proviennent du catalogue européen et des variétés qui sont destinées à la culture de maïs fourrage, alors qu'elles n'ont pas fait l'objet de demande d'inscription en ensilage au catalogue officiel français, et inversement. L'expérimentation de ce type de variétés en essais « probatoires » et de « post-inscription » est effectuée à la demande de l'obteneur ou des utilisateurs.
 - **très largement cultivées.** Les variétés les plus développées en France (top 5 et 10 des ventes et surfaces significatives estimées par des enquêtes des membres de l'UFS) qui n'ont pas été étudiées en Post-Inscription les années antérieures sont expérimentées au titre de variétés de référence, en plus des variétés témoins.
- L'appréciation de la valeur agronomique des nouvelles variétés s'effectue en comparaison à des variétés largement cultivées ou reconnues pour leurs bons résultats.
- Les variétés sont expérimentées et présentées dans les regroupements selon les rubriques suivantes :
- **des variétés de référence et de rappel de séries adjacentes.** Ces variétés correspondent aux témoins de productivité de la série, à des hybrides largement cultivés, ainsi qu'à des témoins de précocité et de tardiveté. Les témoins de séries de précocité adjacentes assurent une continuité de références entre groupes de précocité.
 - **des variétés testées pour la 2^{ème} ou la 3^{ème} année** consécutive en raison de leurs bons résultats agronomiques au cours de l'année précédente et lors des épreuves d'inscription.
 - **des variétés testées pour la 1^{ère} année.**

VARIETES DE MAIS -GRAIN

Les résultats des variétés GRAIN très précoces Série S 10



Variétés de maïs -grain très précoces – S10

Il n'y a pas d'essais de ce type dans la région dans le cadre du réseau Arvalis-Ufs. Le regroupement « Maïs Grain Très Précoces » rassemble des essais de Bretagne, de Normandie et du Nord de la France. Cette année, le niveau de rendement des 10 essais de variétés très précoces atteint 107.4 quintaux pour 33.3 % d'humidité. C'est 5 quintaux de moins que l'an passé mais 3 points d'humidité en plus révélateurs des conditions automnales dans cette zone.

Le marché des « très précoces » est restreint mais ce type de variété peut avoir tout de même son intérêt dans les secteurs les plus froids et surtout lors de semis particulièrement tardifs (printemps pluvieux comme en 2013 ou semis en dérobé après ray-grass).

On signale très peu de verse à la récolte dans les 10 essais du regroupement (3.5 % en moyenne) ce qui ne nous permettra pas de différencier les variétés sur ce critère, sur certaines variétés dont HOXXMANN, variété en 3^{ème} année. Des nouveautés sont également touchées comme CASEY, DS0442A et dans une moindre mesure RGT FAXXANA.

Vu la faible présence de ce type de variétés dans la grande région Est, nous ne détaillons que les variétés les plus intéressantes au niveau de la productivité. Le plus souvent, lorsque l'on fait appel à ce type de précocité pour, par exemple, un ressemis, on prend un peu ce qui est disponible. Le potentiel des variétés ne peut pas s'exprimer pleinement en cas de semis très tardif et les différences entre variétés sont minimales.

Les variétés confirmées que nous conseillons

COLISEE (Semences de France, 2011) perd du terrain cette année alors qu'elle était très productive et régulière

les 4 années précédentes. Reste intéressante. Considérée à bonne tenue de tige.

HOXXMANN (Ragt, 2012) est productive en moyenne des deux dernières années. Pas de souci particulier signalé. Variété cornée-dentée à dessiccation assez lente d'où le point d'humidité supplémentaire par rapport à la moyenne.

KIPARIS (Kws, 2013), hybride trois voies, est bien la plus productive sur trois ans (105.1% de la moyenne en 2013, 107.6 % en 2014 et 102.3 % en 2015) pour une humidité de milieu à fin de groupe selon les années. Pas de problème particulier de tenue de tige ou autre. Très régulière entre les différents sites d'essais.

Variétés en 2^{ème} année

RAMSES (Semences de France, 2014), se place très bien sur deux ans pour une humidité de début de groupe. Intéressante en semis très tardif. Pas de souci de verse.

Les variétés en première année que nous recommandons et conseillons pour « essayer »

LG30215 (Limagrain, 2015) se fait remarquer avec 105.4 % de la moyenne de la série. Humidité de milieu de groupe. A suivre.

KOLOSSALIS (Kws, 2015) obtient également un très bon résultat pour sa première année avec 105.3 % de la moyenne mais par contre avec une humidité plus forte. A suivre.



MAIS GRAIN : Caractérisez votre variété d'un seul coup d'œil

Bretagne, Normandie et Nord

Variétés Très Précoces 10

Source des données : Réseau d'essais de Post-Inscription ARVALIS Institut du végétal, partenaires et UFS Section maïs

Carte d'identité

2014										Infos pluriannuelles					
Variété	Représentant	Date Inscription	Type grain	Productivité (%)			Précocité		Verse (%)	Qualité grain		Tolérance aux maladies			
				2013	2014	2015	Floraison (écart moyenne du regroupement)	% Humidité récolte (écart moyenne du regroupement)		Nb rangs	PMG	Helminthosporose (note de 1 à 10)	<i>Fusarium graminearum</i> (% d'épis touchés)	Tige creuse (%)	
Témoins	KONSENSUS	KWS Maïs France	2008	c.cd	97.2	98.4	96.1	-	-1.6 %	3.0 %	-	-	2.8	9.7 %	
	COLISEE	Semences de France	2011	cc	103.7	106.2	95.1	-	-1.2 %	4.1 %	-	-	2.2	-	
	NK FALKONE	Syngenta France SAS	2007	c.cd	91.8	103.2	94.7	-	0.4 %	2.1 %	-	-	2.4	2.3 %	
	SPHINXX	R.A.G.T. Semences	2008	c.cd	101.7	98.9	99.0	-	0.2 %	2.4 %	-	-	2.6	3.3 %	
Rappel séries adjacentes	MILLESIM	Semences de France	2011	cd	-	-	102.5	-	1.1 %	4.4 %	-	-	2.3	-	
Autres variétés	HOXXMANN	R.A.G.T. Semences	2012	cd	99.0	105.9	101.5	-	1.0 %	6.2 %	-	-	2.7	-	
	IDOLL	Semences de France	2012	c.cd	102.5	101.4	98.6	-	-0.5 %	6.8 %	-	-	2.3	-	
	BENETTO	Semences de France	2013	cc	102.3	99.9	97.0	-	0.1 %	1.0 %	-	-	1.3	2.4 %	
3ème année	KIPARIS	KWS Maïs France	2013	cc	105.1	107.6	102.3	-	0.5 %	2.3 %	-	-	2.8	10.6 %	
	TITTOXX	R.A.G.T. Semences	2012	c.cd	102.6	98.8	97.4	-	-0.1 %	4.0 %	-	-	3.2	-	
	CASEY	Advanta, Marque de Limagrain	2014	c.cd	-	103.2	99.1	-	-1.6 %	6.4 %	-	-	1.4	-	
2ème année	DKC2931	Semences Dekalb/Monsanto	2013	c.cd	-	99.3	98.4	-	-0.7 %	2.6 %	-	-	3.3	8.3 %	
	RAMSES	Semences de France	2014	c.cd	-	105.7	101.5	-	-1.4 %	2.2 %	-	-	3.4	-	
	DIAMENTO	Semences de France	2015	c.cd	-	-	99.8	-	1.0 %	2.0 %	-	-	-	-	
1ère année	JUVENTO	Semences de France	2014	c.cd	-	-	102.3	-	-0.2 %	3.0 %	-	-	-	-	
	KATARSIS	KWS Maïs France	2015	c.cd	-	-	102.9	-	-0.1 %	5.9 %	-	-	-	-	
	KOLOSSALIS	KWS Maïs France	2015	cc	-	-	105.3	-	1.7 %	4.8 %	-	-	-	-	
	KRITERES	KWS Maïs France	2015	cc	-	-	101.2	-	0.2 %	1.9 %	-	-	-	-	
	LG30215	LG, Marque de Limagrain	2015	c.cd	-	-	105.4	-	-0.1 %	1.6 %	-	-	-	-	
	SYFANATIC	Syngenta France SAS	2014	c.cd	-	-	99.8	-	1.4 %	2.6 %	-	-	-	-	
				100 % =			100.8 qx/ha	112.4 qx/ha	107.4 qx/ha	33.3 %	3.5 %	2.5	5.0 %		
				Moyenne du regroupement											

Verse
0% ≤ X < 2.5%
2.5% ≤ X < 5%
5% ≤ X < 7.5%
7.5% ≤ X < 10%
10% ≤ X


Rendement
% de la moyenne des essais
≥ 104 %
101% ≤ X < 104%
99% ≤ X < 101%
96% ≤ X < 99%
≤ 96 %

Echelle de notation :
++
+
+/-
-
--

Retenus pour verse
8 ST QUENTIN LE PETIT
22 LA CHEZE
22 LE FAUQUET
29 LANDELEAU
62 VILLERS LES CAGNICOURT

Retenus pour rendement et précocité
8 ST QUENTIN LE PETIT
14 ST GABRIEL BRECY
22 LA CHEZE
22 LE FAUQUET
22 TREGOMEUR
29 LANDELEAU
29 ST COULITZ
35 ST GERMAIN EN COGLES
61 SEES
62 VILLERS LES CAGNICOURT

Les résultats des variétés GRAIN précoces Série S 11



Variétés de maïs-grain précoces S11

Variétés grain précoces

Le regroupement de cette année comprend 8 essais de la zone Nord-Est et Centre-Est. La productivité moyenne est faible avec seulement 91.9 q/ha soit 30 quintaux de moins que l'an dernier ! L'humidité moyenne est correcte pour des variétés à dominante cornée avec 29.8 % de teneur en eau.

Variétés de référence

KOHERENS (KWS, 2008) est essentiellement cultivée pour sa précocité et la qualité semoulière de ses beaux grains ronds. Elle est largement dépassée par génétique plus récente. Floraison précoce comme la plupart des variétés de KWS. Convient aussi en fourrage.

MILLESIM (Semences de France, 2011) marque le pas cette année difficile avec seulement 97.7 % de la moyenne, alors qu'elle était auparavant assez régulière. Floraison précoce et humidité à la récolte intéressante. Cornée-dentée à nombre de rangs/épi élevé. Gabarit moyen. Très bonne tenue de tige. Présence de fusarium graminearum possible.

ADEVEY (Advanta, 2011), est avantagée par sa tardivité (+1.1 point d'humidité/moyenne), et devrait être comparée à la série S12. Ses bons résultats sont indéniables et elle n'a pas de défaut majeur. Grand gabarit qui a montré des signes de verse en zone Est cette année.

PR38N86 (demi précoce S12) figure dans la série en tant que borne de tardivité.

Autres variétés

KANDIS (Kws, 2010), hybride 3 voies cornée-dentée, inscrite en fourrage mais testée avec succès en grain en 2013 et 2014, s'avère bien faible cette année. Humidité de milieu de groupe. Grand gabarit d'où son attrait en fourrage. Gros pmg. Verse possible à surmaturité (pas vu en 2015). Présence de fusarium graminearum possible.

LINDSEY (Advanta, 2011) subi un peu le même sort. Mauvais résultats cette année suite à une bonne campagne 2014. Plutôt moyen à fin de groupe de par le caractère très corné de ses grains. Grand gabarit. De la verse récolte est signalée dans les essais du réseau Nord-Est.

KONKORDANS (Kws, 2012), hybride 3 voies, se place depuis maintenant trois ans au niveau de la moyenne. Intéressante pour sa très bonne tenue de tige et sa précocité. Comportement semoulier. Très gros pmg et petit nombre de rangs. Floraison très précoce.

KROISSANS (Kws, 2013) procure 100.9 % de la moyenne après deux excellentes années. Fleurie tôt mais finit tard de par son caractère corné (c.cd). Variété de fin de groupe.

Variétés en 2^{ème} année.

RIVALDINIO KWS (Kws, D-2013) n'apporte rien de particulier. Présente de la verse à la récolte dans les

essais du réseau Nord-Est peut-être due à une vidange excessive des tiges.

DKC3730 (Dekalb, UE-2012) testée avec succès dans le réseau probatoire en 2013, puis l'an passé dans le réseau UFS-Arvalis (105.4 %), elle est moins vaillante cette année (101 %) mais est une valeur confirmée pour les futurs semis. Dentée pure à floraison tardive et à bonne dessiccation des grains qui la place en milieu de groupe. Attention, de la verse est possible si on tarde trop la récolte.

MAS 29T (Maïsador, 2013) est très productive sur 3 ans (105% au probatoire 2013, puis 101.7% en 2014 et enfin 105.9 % cette année). Dentée pure plutôt de fin de groupe avec 2 points de plus que la moyenne. Floraison tardive. Verse à la récolte à surveiller.

Variétés en 1ère année.

DKC3350 (Dekalb, 2015) est cornée mais se comporte bien en fin de cycle. Très bonne tenue de tige. Rendement décevant pour sa première année.

DKC3350 (Dekalb, 2015) est cornée mais se comporte bien en fin de cycle. Très bonne tenue de tige. Rendement décevant pour sa première année.

DKC3350 (Dekalb, 2015) est cornée mais se comporte bien en fin de cycle. Très bonne tenue de tige. Rendement décevant pour sa première année. C'est aussi le cas pour **DKC3440** (Dekalb, IT-2014) qui est plus denté. Fragilité de fin de cycle avec de la verse.

FIGARO (Semences de France, 2015), variété cornée-dentée et **BELCANTO** (Semences de France, 2014) très cornée, se positionnent en milieu de groupe pour leur précocité et leur productivité.

RGT PLANOXX (Ragt, 2015) déçoit en rendement. Présence de tiges creuses à surveiller.

ES METRONOM (Euralis, 2015) est très cornée et trouvera sa place dans les créneaux semouliers. Rendements décevants cette année compensés par la prime qualité. Fleurit tôt mais finit dans la moyenne. Excellente tenue de tige, y compris en fin de cycle.

ES CREATIVE (Euralis, 2015) est plus tardive à floraison mais aussi plus productive cette année avec 106.6 % de la moyenne ! Très bonne tenue de tige. A suivre.

KONFLUENS (Kws, 2015) procure de bons résultats pour sa première année. Se situe en milieu de groupe. Caractère semoulier prévisible, à suivre.

ACROPOLE (Semences de France, 2015) est issue de la même génétique que la précédente. Plus tardive à floraison mais à peu près les mêmes caractères. C'est aussi le cas pour **KROQUIS** (Kws, 2014) qui est très proche. Tendance à la verse récolte à signaler pour cette dernière.


DKC3939 (Dekalb, IT-2014) est la gagnante de l'année dans cette série avec 108.4 % de la moyenne ! Plutôt tardive dans cette série ce qui peut la favoriser à l'image d'Adevey. Pas de souci particulier. A suivre.

ON SE RESUME	Maïs grain précoces (série 11)	Valeurs sûres	Variétés qui confirment	A essayer en 2015
	Précocité début de groupe	KONKORDANS		
	Précocité milieu de groupe	DKC3730	MAS 29T	ES CREATIVE KONFLUENS
	Précocité fin de groupe	ADEVEY KROISSANS		DKC3939

dept	Lieu	Semis	Récolte	H2O	RDT
8	SAINT-QUENTIN-LE-PETIT	22/04/15	14/10/15	31.6	112.9
67	SCHWINDRATZHEIM	13/04/15	01/10/15	21.5	95.5
60	BABOEUF	23/04/15	22/10/15	35.3	94.6
60	SAINT-VAAST-LES-MELLO	10/04/15	25/09/15	33.7	96.6
2	VERNEUIL-SUR-SERRE	10/04/15	15/10/15	32.0	106.3
51	VAUCLERC	16/04/15	25/09/15	26.7	70.4
67	SEEBACH	16/04/15	22/09/15	28.4	102.6
10	PRECY-NOTRE-DAME	20/04/15	17/09/15	28.9	56.5



Série 11 - Précoces - Nord Est et Centre Est Résultats 2015 - 8 essais - Arvalis - Ufs



MAIS GRAIN : Caractérisez votre variété d'un seul coup d'œil

Nord-Est et Centre-Est
Variétés Précoces (11)

Source des données : Réseau d'essais de Post-Inscription ARVALIS Institut du végétal, partenaires et UFS Section maïs

Carte d'identité

	Variété	Représentant	Année inscription	Type grain	Productivité (%)			Précocité		Verse (%)		Structure épis		Tolérance aux maladies	
					2013	2014	2015	Floraison (écart moyenne du regroupement nt)	% humidité récolte (écart moyenne du regroupement)	Toutes zones	Zone EST	Nb rangs	PMG	Hélmithosporose (note de 1 à 10)	Fusarium graminearum (% d'épis touchés)
Témoins	MILLESIM	Semences de France	2011	cd	103.1	102.4	97.2	-1.7	28.3 %	3.26	6.2	15.1	-	2.7	10.9 %
	KOHERENS	KWS Maïs France	2008	c.cd	99.4	97.9	97.7	-2.2	28.5 %	2.84	4.3	13.6	-	2.8	7.1 %
	ADEVY	Advanta, Marque de Limagrain	2011	cd	104	104.1	102.7	-0.2	30.9 %	2.67	8.1	13.8	-	1.3	2.9 %
Rappel série adjacente	PR38N86	Pioneer Semences	AT-2007	d	-	-	101.8	0.8	30.8 %	2.78	3.8	14.5	-	-	-
Autres variétés	KONKORDANS	KWS Maïs France	2012	c.cd	100.5	99.8	100.5	-2.2	28.9 %	2.92	7.1	11.5	-	1.9	4.3 %
	KANDIS	KWS Maïs France	2010	c.cd	100.5	101.9	94.7	-2.2	29.3 %	5.3	3.9	15.1	-	2.3	9.4 %
	LINDSEY	Advanta, Marque de Limagrain	2011	cc	-	102.1	96.8	-1.7	29.5 %	2.2	10.6	13.7	-	1.8	5.7 %
	KROISSANS	KWS Maïs France	2013	c.cd	105	104.8	100.9	-1.7	30.4 %	5.33	5.6	15.7	-	2.6	9.1 %
2ème année	RIVALDINO KWS	KWS Maïs France	DE-2013	c.cd	-	100.7	96.5	-0.7	29.2 %	4.66	12.8	13.0	-	2.6	8.4 %
	DKC3730	Semences Dekalb/Monsanto	HU-2012	d	-	105.4	101.0	1.8	29.7 %	7.56	7.5	14.9	-	1.7	2.7 %
	MAS 29T	Maisadour Semences	2013	d	-	101.7	105.9	2.8	31.8 %	2.57	9.9	14.1	-	2.1	1.5 %
1ère année	DKC3350	Semences Dekalb/Monsanto	2015	c.cd	-	-	96.0	2.3	28.7 %	2.1	1.7	14.4	-	-	-
	DKC3440	Semences Dekalb/Monsanto	IT-2014	cd.d	-	-	97.5	-1.2	28.7 %	5.26	11.6	14.5	-	-	-
	FIGARO	Semences de France	2015	c.cd	-	-	99.1	1.3	29.0 %	1.86	6.7	13.4	-	-	-
	BELCANTO	Semences de France	2014	cc	-	-	98.9	-1.7	29.1 %	4.05	5.5	13.0	-	-	-
	RGT PLANOX	R.A.G.T. Semences	2015	cd.d	-	-	95.6	2.3	29.1 %	4.01	7.4	15.2	-	-	-
	ES METRONOM	Euralis Semences	2015	cc	-	-	95.2	-2.2	29.7 %	1.39	2.9	14.2	-	-	-
	ES CREATIVE	Euralis Semences	2015	cd	-	-	106.6	2.3	29.7 %	2.59	3.8	14.0	-	-	-
	KONFLUENS	KWS Maïs France	2015	c.cd	-	-	102.2	0.3	30.2 %	3.53	5.1	13.7	-	-	-
	ACROPOLE	Semences de France	2015	c.cd	-	-	102.4	1.8	30.8 %	4.93	7.4	13.4	-	-	-
	KROQUIS	KWS Maïs France	2014	c.cd	-	-	102.3	0.3	30.9 %	4.5	10.5	15.0	-	2.8	-
	DKC3939	Semences Dekalb/Monsanto	IT-2014	cd.d	-	-	108.4	1.8	31.7 %	0.4	4.6	14.4	-	-	-
Moyenne du regroupement					110.4 qx/ha	121.8 qx/ha	91.9 qx/ha	2 essais 9 juillet	8 essais 29.8 %H20	29 essais 3.6 %	5 essais 6.7 %	1 essai 17.1 %	1 essai 17.1 %	42 essais 2.4	11 essais 5.0 %

2014 Retenus pour rendement et précocité
Dept Commune
2 VERNEUIL SUR SÈRE
51 EIREPY
51 VAULIERC
67 SCHWINDRATZHEIM
67 SEEBACH
70 MONTSEUGNY

Echelle de notation :

++
+
+/-
-
--

Rendement

% de la moyenne des essais

≥ 104 %
101% ≤ X < 104%
99% ≤ X < 101%
96% ≤ X < 99%
≤ 96 %

Verse

%


0% ≤ X < 2.5%
2.5% ≤ X < 5%
5% ≤ X < 7.5%
7.5% ≤ X < 10%
10% ≤ X

PMG

g

TP < 270
270 < P < 300
300 < M < 330
330 < G < 360
TG > 360

Les résultats des variétés
GRAIN demi-précoces
cornées-dentées
Série S 12



Variétés de maïs-grain demi-précoces S12

Les huit essais du regroupement 2015 sont productifs, maïs en léger recul par rapport à l'an passé avec 122.7 q/ha en moyenne. La fin de cycle a été très favorable puisque l'humidité moyenne est de 23.9 % permettant de limiter les frais de séchage. La vidange des tiges a pu provoquer la fragilité de celles-ci et de la verse à la récolte sur quelques variétés.

Variétés de référence

PR38N86 (Pioneer, AT-2007) est considérée comme un témoin. Commence à être dépassée. Gros pmg souvent supérieur à 360 g. Grand gabarit.

DKC4117 (Dekalb, 2011) peut également être considérée comme témoin en se plaçant dans la moyenne des rendements et de l'humidité. Très régulière entre lieux. Nombre de rangs par épi important et pmg moyen. Bonne tenue de tige.

KWS 9361 (Kws, 2011) est également témoin, moyenne en tout, sauf peut-être en tenue de tige où elle est un peu chahutée en fin de cycle.

OBIXX (demi précoce S13) figure dans la série en tant que borne de tardivité.

Autres variétés

ES GALLERY (Euralis, 2012) est encore très productive dans cette série où elle n'avait pas été testée en 2014. Valeur confirmée. Grande taille et port dressé. Nombreux petits grains.

P9400 (Pioneer, AT-2008), est en retrait cette année après de belles campagnes. Floraison précoce et humidité de milieu de groupe. Peu rustique. Petits pmg et nombre de rangs élevé. Bonne tenue de tige.

P9175 (Pioneer, UH-2011), n'est pas si productive par rapport aux autres en 2014. Correct sur deux ans et humidité un peu supérieure à la moyenne. Grande.

Variétés en 3^{ème} année

DKC3930 (Dekalb, 2013) et **DKC3931** (Dekalb, 2013) sont très proches. Elles sont particulièrement régulières entre lieux. Font leur rendement grâce à un pmg élevé. Bonne tenue de tige pour les deux.

Variétés en 2^{ème} année

P8816 (Pioneer, 2014) est moyenne en rendement et se situe en début de groupe vis-à-vis de l'humidité. Dentée pure. Fragilité possible en fin de cycle si elle n'est pas récoltée à temps.

KONFERENS (Kws, 2014) est en retrait cette année. Intéressante en pluriannuel. Présente de la verse à la

récolte dans certains essais. Fait son rendement avec peu de grains et gros pmg.

RGT CONEXION (Ragt, 2014), est tout juste à la moyenne alors qu'elle était la plus productive en 2014. A pu souffrir des conditions stressantes de l'année. Gros pmg et peu de grains. Très bonne tenue de tige. A conserver en situation bien pourvue en eau.

RGT PROVEXX (Ragt, 2014), variété dentée remarquée l'an passé, fait bien mieux en 2015 avec 103.2 % de la moyenne. Bonne tenue de tige. Fusarium graminearum possible vu en 2014.

EXCLUSIV (Ragt, 2013), déçoit dans ce regroupement avec 97.8 % alors qu'elle avait fait 104 % de la moyenne en 2014, en conditions bien alimentées en eau. Humidité de milieu de groupe. Fait son rendement avec peu de gros grains. Très bonne tenue de tige.

Variétés en 1^{ère} année

ARDENNO (Saatbau, AU-2013) est une nouvelle génétique dentée inscrite à l'étranger. Moyenne cette année dans souci particulier. Précoce.

ARKADI CS (Caussade, 2014) est un peu juste dans le regroupement 2015. Précocité dans la moyenne. Petit pmg et beaucoup de grains.

DKC3938 (Dekalb, HU-2014) se fait remarquer en prenant la première place avec 105.2 % de la moyenne. Humidité dans la moyenne et très bonne tenue de tige. Petit pmg et nombreux grains. A suivre.

KARAMELIS (Kws, 2015) et **KLEONARS** (Kws, AU-2014) déçoivent dans ce regroupement. Elles peuvent présenter de la verse à la récolte surtout à sur-maturité. Humidité moyenne.

LBS3403 (Lur Berri Semences, 2015) est dans la moyenne pour le rendement et l'humidité. Gros pmg, peu de grains. Tenue de tige à surveiller.

PORTORICO (Semences de France, 2015) déçoit. Attention, présence de la verse à la récolte en cette fin de campagne.



RGT DUBLIXX (Ragt, 2014) obtient un bon résultat cette année avec 102.9 % de la moyenne pour une humidité médiane dans ce groupe. Bonne tenue de tige. A suivre.

RGT XXAVI (Ragt, 2015) est trop moyenne. Fait son rendement avec peu de grains mais à gros pmg. Bonne tenue de tige.

TROCADERO (Ragt, 2014) ne produit que 98 % de la moyenne mais est peut-être défavorisée par sa précocité dans cette série avec 1.7 point d'humidité en moins. A revoir l'an prochain.

N SE RESUME	Maïs grain précoces (série 12)	Valeurs sûres	Variétés qui confirment	A essayer en 2015
	Précocité début de groupe		RGT PROVEXX	
	Précocité milieu de groupe	ES GALLERY DKC3930 DKC3931	KONFERENS P8816	DKC3938 RGT DUBLIXX
	Précocité fin de groupe		RGT CONEXION	

Dep	Lieu	Semis	Récolte	H2O	RDT
63	AUBIAT	22/04/15	26/09/15	29.3	147.6
67	WESTHOUSE	14/04/15	08/10/15	22.2	112.6
71	SAINT-DIDIER-EN-BRESSE	23/04/15	19/10/15	24.3	98.2
63	THURET	21/04/15	07/10/15	23.0	137.7
21	LOSNE	11/04/15	13/10/15	22.9	129.6
39	SAINT-AUBIN	16/04/15	16/10/15	21.1	114.0
67	BREUSCHWICKERSHEIM	12/04/15	23/09/15	27.7	99.3
68	RUSTENHART	23/04/15	10/10/15	20.8	142.9



Carte d'identité

MAIS GRAIN : Caractérisez votre variété d'un seul coup d'œil

Alsace, Centre-Est et Vallées Continentales

Variétés 1/2 Précoces Cornées Dentées C1 (12)

Source des données : Réseau d'essais de Post-Inscription ARVALIS Institut du végétal, partenaires et UFS Section maïs

2015																Infos pluriannuelles	
	Variété	Représentant	Année inscription	Type grain	Productivité (%)			Précocité		Verse (%)	Structure épis		Tige creuse (%)	Tolérance aux maladies			
					2013	2014	2015	Floraison (écart moyenne du regroupement)	% humidité récolte (écart moyenne du regroupement)		Nb rangs	PMG		Helminthosporiose (note de 1 à 10)	Fusarium (% d'épis touchés)		
Variétés de référence	DKC4117	Semences Dekalb/Monsanto	2011	cd,d	98	97.5	99.0	- 0 j	+ 0.5 %	3.4 %	16.2	G	1.3 %	1.1	7.7 %		
	PR38N86	Pioneer Semences	AT-2007	d	98.5	99.7	97.6	+ 2 j	- 0.5 %	3.9 %	14.8	G	3.0 %	1.5	2.0 %		
	KWS 9361	KWS Maïs France	2011	cd	99.5	95.5	99.2	+ 0 j	+ 0.7 %	8.0 %	14.0	M	2.1 %	1.8	7.1 %		
Rappel de séries adjacentes	OBIXX	R.A.G.T. Semences	2011	d			103.1	- 3 j	+ 2.3 %	5.6 %	16.0	M	8.5 %	-	-		
Autres variétés	ES GALLERY	Euralis Semences	2012	cd	104.1		104.1	- 0 j	- 0.0 %	6.8 %	15.8	M	4.1 %	2.1	6.0 %		
	P9175	Pioneer Semences	HU-2011	d			100.7	- 0 j	+ 0.8 %	9.6 %	13.6	G	4.7 %	-	-		
	P9400	Pioneer Semences	AT-2008	cd,d	104.7	102	98.6	- 2 j	+ 0.5 %	5.2 %	15.6	G	2.4 %	1.8	5.3 %		
Variétés en 3 ^{ème} année	DKC3930	Semences Dekalb/Monsanto	2013	cd,d	105.9	103.7	102.0	+ 1 j	+ 0.2 %	3.2 %	15.0	G	0.4 %	2.2	3.6 %		
	DKC3931	Semences Dekalb/Monsanto	2013	cd	101.8	101.3	103.2	- 0 j	- 0.1 %	2.8 %	15.6	M	0.6 %	1.4	4.2 %		
Variétés en 2 ^{ème} année	EXXCLUSIV	R.A.G.T. Semences	2013	cd		104.3	97.9	- 2 j	+ 0.2 %	3.9 %	13.6	G	3.9 %	3.1	1.4 %		
	KONFERENS	KWS Maïs France	2014	cd,d		103.3	99.8	+ 1 j	- 0.4 %	14.4 %	12.8	TG	9.4 %	-	3.8 %		
	P8816	Pioneer Semences	2014	d		102	99.1	+ 2 j	- 1.1 %	10.3 %	14.1	M	6.9 %	2.3	2.5 %		
	RGT CONEXION	R.A.G.T. Semences	2014	cd,d		105.2	99.8	+ 0 j	- 0.3 %	2.8 %	13.0	TG	3.8 %	2.9	3.1 %		
	RGT PROVEXX	R.A.G.T. Semences	2014	d		101.4	103.2	+ 1 j	- 0.2 %	5.1 %	13.4	TG	4.9 %	2.6	9.0 %		
Variétés en 1 ^{ère} année	ARDENNO	Saatbau France	AU-2013	d			100.7	- 1 j	- 0.7 %	4.8 %	15.2	M	5.3 %	-	2.2 %		
	ARKADICS	Causade Semences	2014	cd,d			98.5	- 1 j	+ 0.3 %	5.6 %	15.1	P	2.9 %	-	-		
	DKC3938	Semences Dekalb/Monsanto	HU-2014	cd,d			105.2	- 0 j	- 0.1 %	1.4 %	15.0	M	1.7 %	-	6.5 %		
	KARAMELIS	KWS Maïs France	2015	cd,d			98.8	+ 1 j	- 0.0 %	8.0 %	13.9	M	10.5 %	-	8.9 %		
	KLEONARS	KWS Maïs France	AU-2014	cd			94.1	- 1 j	- 0.6 %	10.2 %	15.2	G	4.0 %	-	6.8 %		
	LBS3403	LBS, Marque Lur Berri	2015	cd,d			99.1	+ 0 j	+ 0.3 %	7.9 %	13.9	G	4.2 %	-	1.5 %		
	PORTORICO	Semences de France	2015	cd			96.8	+ 1 j	- 0.3 %	16.6 %	14.0	M	4.5 %	-	13.8 %		
	RGT DUBLIXX	R.A.G.T. Semences	2014	cd,d			102.9	+ 0 j	+ 0.2 %	3.6 %	14.0	G	5.0 %	-	3.2 %		
	RGT XXAVI	R.A.G.T. Semences	2015	cd			98.6	- 0 j	+ 0.3 %	3.7 %	14.3	G	2.0 %	-	0.8 %		
	TROCADERO	Semences de France	2015	cd,d			98.0	+ 1 j	- 1.7 %	6.6 %	13.8	M	6.5 %	-	11.4 %		
Moyenne du regroupement					120.3 qx/ha	128.4 qx/ha	122.7 qx/ha	4 essais	6 essais	9 essais	3 essais	2 essais	29 essais	16 essais			
						100 % =				6.4 %	14.5	333 g	4.3 %	2.1	5.0 %		

PMG
g
TP < 270
270 <P<300
300<M<330
330<G<360
TG>360


Verse
%
0% ≤ X <2.5%
2.5% ≤ X <5%
5% ≤ X <7.5%
7.5% ≤ X <10%
10% ≤ X

Rendement
% de la moyenne des essais
≥ 104 %
101% ≤ X <104%
99% ≤ X <101%
96% ≤ X <99%
≤ 96 %

Echelle de notation :
++
+
+/-
-
--

2015) Retenus pour rendement et précocité	2015) Retenus verse
21) LOSNE	28) RECLANVILLE
39) ST AUBIN	39) ST AUBIN
63) AUBIAT	63) AUBIAT
63) THURET	63) THURET
67) BREUSCHWICKERSHEIM	67) BREUSCHWICKERSHEIM
68) RUSTENHART	68) RUSTENHART
71) ST ODIER EN BRESSE	71) ST ODIER EN BRESSE
72) LOUVIGNY	72) LOUVIGNY
85) VARE	85) VARE

Les résultats des variétés GRAIN demi-précoces dentées Série S 13



Variétés de maïs-grain demi-précoces dentées S13

Les 5 essais qui subsistent dans cette série cette année sont irrigués et particulièrement productifs avec 141.5 q/ha. L'humidité moyenne est faible avec 23.4 %, et reflète les bonnes conditions automnales.

Variétés de référence

OBIXX (Ragt, 2011) est un témoin à bon potentiel, très régulière entre lieux mais aussi entre année. C'est une valeur sûre. Fait son rendement par un nombre de grains/m² élevé et des petits pmg. Bon comportement face à la fusariose des épis. Grand gabarit, à floraison tardive, qui peut présenter des tiges creuses à sur-maturité.

DKC4590 (Dekalb, HU-2009) n'est plus à présenter. C'est la variété à battre dans cette série pour progresser. Toujours aux premiers postes. Bonne tenue de tige. Préfère les situations chaudes, bien alimentées en eau.

ES FLATO (Euralis, IT-2009) commence à lacher du terrain face aux nouvelles. Relativement « rustique, sans problème particulier » Petit gabarit.

FERARIXX (Ragt, 2012) n'a pas trop aimé l'année 2015 car elle est en retrait après deux excellentes campagnes. Bonne en pluriannuel. Valorise bien les bonnes terres et l'irrigation. Gros pmg et peu de grains. Son grand gabarit peut la fragiliser un peu.

KWS 9361(demi précoce S12) et **DKC4795** (demi tardive S14) figurent dans la série en tant que bornes de précocité et de tardivité.

Autres variétés

P9578 (Pioneer, AT-2009) continue à présenter une bonne fertilité avec en moyenne plus d'un épi par plante, d'où un grand nombre de grains/m² et des petits pmg. Bonne dessiccation d'où une précocité dans cette série avec 1.7 points de moins que la moyenne. Plante à gabarit moyen.

MARTELI (Caussade, IT-2012) est très régulière depuis deux ans. Valeur sûre de début de groupe. Sans souci particulier. Fait son rendement avec peu de gros grains.

DKC4522 (Dekalb, 2012) est également une valeur sûre en pluriannuel. Dans la moyenne en humidité. Tenue de tige en fin de cycle à surveiller.

Variétés en 1^{ère} année

DKC4444 (Dekalb, 2015) est moins productive dans ce regroupement que son mentor DKC4590. Légèrement plus précoce. Sans souci particulier à signaler.

DKC4541 (Dekalb, HU-2014) se situe au niveau du potentiel de DKC4590 et à même précocité. Très bonne tenue de tige. Bonne tolérance aux situations restrictive en eau.

DS1071C (De Sangosse, SK-2014) est plutôt une variété de début de groupe. N'est pas à la hauteur de ses espérances dans les hauts potentiels irrigués. Denté pure. Très bonne tenue de tige.

JACUZI (Caussade, 2015) présente l'avantage d'amener de la précocité dans cette série. Potentiel dans la moyenne du groupe. Intéressante en iso-rendement net. A suivre.

KAMPONI CS (Caussade, 2015) est proche mais avec des résultats un peu en retrait. Précoce.

KOMPARES (Kws, 2015) a potentiel correct pour une humidité du niveau du témoin DKC4590. De type beaucoup de grains mais petit pmg. La fin de campagne avec une forte vidange des tiges l'a fragilisé (16.6 % de verse récolte)

LBS3207 (Lur Berri Semences, 2013) devra faire mieux en rendement dans les hauts potentiels. Humidité correcte. Petit pmg et grand nombre de grains. Fragilité de fin de cycle avec de la verse récolte.

LOUDOR (Semences de France, 2014) est décevante en rendement et en tenue de tige. Petits pmg et grosse programmation.




RGT PREFIXX (Ragt, 2015) est trop tardive pour un rendement un peu faible ce qui la classe mal en iso-rendement net. Très bonne tenue de tige.

SY DARTONA (Syngenta, 2015) est une alternative à suivre pour son rapport rendement / précocité. Attention, elle semble sensible aux conditions de fin de cycle en affichant 18.1 % de verse dans les essais.

SY IZOAR (Jouffray-Drillaud, 2015) est une bonne surprise en se plaçant exactement au niveau de DKC4590 pour sa première année. Tenue de tige à vérifier. Elle présente un très gros pmg (380 g) pour un faible nombre de grains.

ON SE RESUME	Maïs grain précoces (série 12)	Valeurs sûres	Variétés qui confirment	A essayer en 2015
	Précocité début de groupe	OBIXX	MARTELI	JACUZI
	Précocité milieu de groupe	DKC4522 DKC4590 FERARIXX		DKC4541 SY IZOAR
	Précocité fin de groupe			

Dep	Lieu	Semis	Récolte	H2O	RDT
3	LA FERTE-HAUTERIVE	16/04/15	05/10/15	24.0	143.9
67	WESTHOUSE	14/04/15	08/10/15	25.0	115.2
68	URSCHENHEIM	14/04/15	07/10/15	21.0	142.5
1	MISERIEUX	21/04/15	15/09/15	26.5	49.8
38	MARCILLOLES	16/04/15	24/09/15	25.6	157.3
68	BATTENHEIM	13/04/15	02/10/15	21.2	148.6



MAIS GRAIN : Caractérisez votre variété d'un seul coup d'œil

Alsace, Centre-Est et Vallées Continentales

Variétés 1/2 Précoces Dentées C2 (13)

Source des données : Réseau d'essais de Post-Inscription ARVALIS Institut du végétal, partenaires et UFS Section maïs

Carte d'identité

2015														infos pluriannuelles	
	Variété	Représentant	Année inscription	Type grain	Productivité (%)			Précocité		Verse (%)	Structure épis		Tige creuse (%)	Tolérance aux maladies	
					2013	2014	2015	Floraison (écart moyen du regroupement)	% humidité récolte (écart moyen du regroupement)		Nb rangs	PMG		Helminthosporiose (note de 1 à 10)	Fusarium graminearum (%) (d'épis touchés)
Variétés de référence	DKC4590	Semences Dekalb/Monsanto	HU-2009	d	101.9	102.2	103.8	-0 j	+0.7 %	6.3 %	15.8	G	4.1 %	-	3.2 %
	ES FLATO	Euralis Semences	IT-2009	d	97.3	100.3	97.7	+2 j	+0.0 %	4.4 %	16.8	G	0.8 %	-	8.1 %
	OBIXX	R.A.G.T. Semences	2011	d	101.7	102.4	101.5	-2 j	-0.2 %	8.2 %	16.8	M	2.1 %	-	2.7 %
Rappel de séries adjacentes	FERARXX	R.A.G.T. Semences	2012	cd	104.5	104.1	99.8	-1 j	+0.0 %	3.6 %	14.9	TG	2.5 %	-	2.9 %
	KWS 9361	KWS Maïs France	2011	cd		92.8	97.2	+1 j	-0.0 %	5.8 %	15.2	G	0.4 %	-	-
	DKC4795	Semences Dekalb/Monsanto	2009	cd,d			103.1	-1 j	+2.0 %	2.0 %	16.2	TG	2.8 %	-	-
Autres variétés	DKC4522	Semences Dekalb/Monsanto	2012	cd,d	102.4	100.3	102.0	+0 j	-0.1 %	7.3 %	16.1	G	8.3 %	-	2.4 %
	MARTELI	Causade Semences	IT-2012	cd,d	-	102.9	101.2	+1 j	-1.6 %	3.3 %	15.5	TG	0.5 %	-	2.5 %
	P9578	Pioneer Semences	AT-2009	d	102.3	99.1	96.7	+1 j	-1.7 %	4.4 %	15.2	M	0.8 %	-	5.3 %
Variétés en 1ère année	DKC4444	Semences Dekalb/Monsanto	2015	cd,d			99.5	+2 j	+0.1 %	4.7 %	16.9	TG	2.2 %	-	-
	DKC4541	Semences Dekalb/Monsanto	HU-2014	d			102.4	+1 j	+0.5 %	1.9 %	15.6	TG	3.2 %	-	11.1 %
	DS1071C	De Sangosse	SK-2014	d			97.8	-1 j	-0.4 %	3.0 %	15.1	G	5.1 %	-	10.0 %
	JACUZI	Causade Semences	2015	cd,d			100.8	-1 j	-1.2 %	6.2 %	16.3	G	0.6 %	-	-
	KAMPONI CS	Causade Semences	2015	cd			98.3	-2 j	-1.3 %	6.6 %	15.6	M	2.8 %	-	5.3 %
	KOMPARES	KWS Maïs France	2015	cd,d			100.5	+1 j	+0.7 %	16.6 %	16.7	M	4.4 %	-	10.5 %
	LBS3207	LBS, Marque Lur Berri	2013	cd,d			99.8	+1 j	-1.2 %	13.3 %	15.9	M	5.6 %	-	-
	LOUIDOR	Semences de France	2014	cd,d			94.9	+1 j	-0.6 %	15.2 %	15.4	M	1.1 %	-	-
	RGT PREFIXX	R.A.G.T. Semences	2015	cd,d			98.4	-0 j	+1.9 %	3.2 %	15.8	TG	0.7 %	-	8.7 %
	SYDARTONA	Syngenta France SAS	2015	cd,d			101.8	-2 j	+0.7 %	18.1 %	15.0	G	1.3 %	-	9.3 %
	SY IZOAR	Jouffray - Drillaud Sem.	2015	d			103.0	-1 j	+0.8 %	8.7 %	15.0	TG	9.4 %	-	2.6 %
			Moyenne du regroupement		137.5 qx/ha	100 % = 128.4 qx/ha	141.5 qx/ha	4 essais 5 juillet	6 essais 23.4 % H20	8 essais 7.1 %	4 essais 15.8	5 essais 351 g	4 essais 2.9 %	23 essais 5.0 %	

2015	Retenus pour rendement et précocité
3	LAFERTE HAUTERIVE
38	MARCIILLOLES
64	GER
68	URSCHENHEIM
67	WESTHOUSE
68	BATTENHEIM
68	URSCHENHEIM

2015	Retenus pour verse
16	FOUQUEURE
38	MARCIILLOLES
64	GER
68	URSCHENHEIM
79	PAZAY LE TORT
85	LUCON
86	CHATEAULARCHER
86	SAMMARCOLLES

2015	Retenus pour rendement et précocité
3	LAFERTE HAUTERIVE
38	MARCIILLOLES
64	GER
68	URSCHENHEIM
67	WESTHOUSE
68	BATTENHEIM
68	URSCHENHEIM


2015	Retenus pour verse
16	FOUQUEURE
38	MARCIILLOLES
64	GER
68	URSCHENHEIM
79	PAZAY LE TORT
85	LUCON
86	CHATEAULARCHER
86	SAMMARCOLLES

Rendement
% de la moyenne des essais
≥ 104 %
101% ≤ X <104%
99% ≤ X <101%
96% ≤ X <99%
≤ 96 %

Verse
%
0% ≤ X <2.5%
2.5% ≤ X <5%
5% ≤ X <7.5%
7.5% ≤ X <10%
10% ≤ X

PMG
g
TP < 270
270 <P<300
300<M<330
330<G<360
TG>360

Les résultats des variétés GRAIN demi-tardives Série S 14



Variétés de maïs-grain demi-tardives S14

Cette année le regroupement n'est composé que de 5 essais, tous irrigués et à fort potentiel avec 149.7 q/ha, soit 10 de plus que 2014. Les autres essais ont trop souffert du stress hydrique pour être regroupés.

Variétés de référence

DKC4795 (Dekalb, 2009) est dépassé au niveau potentiel. Elle a la capacité à perdre de l'humidité en fin de cycle. Considérée comme une référence de « rusticité » dans ce groupe.

DKC4814 (Dekalb, 2011) se comporte très bien cette année après un relatif passage à vide en 2014. Intéressante en pluriannuel, c'est une valeur sûre dans cette série. Humidité de milieu de groupe. Soucis de *Fusarium graminearum* l'an passé et un peu de tiges creuses.

PIXXTOL (RAGT, 2011) Variété de milieu de groupe, qui présente depuis 4 ans des résultats intéressants. Un grand nombre de rangs par épis et des pmg moyens.

FERARIXX (1/2 précoce S13) et **DKC5190** (1/2 tardive S15) figurent dans la série en tant que bornes de précocité et de tardivité.

Autres variétés

LG 30491 (Limagrain, 2011) déçoit maintenant et est dépassé par la nouvelle génétique. Bon comportement face aux fusarioses. Très grand maïs qui peut verser dans les endroits exposés au vent. Petit nombre de rangs par épi pour de très gros pmg.

P9838 (Pioneer, RO-2012) est généralement précoce dans cette série ce qui ne se voit pas cette année. Résultats de rendement inférieurs aux autres. Très bonne tenue de tige.

DKC 5031 (Dekalb, 2013), petite en taille, typé grain à port dressé. Moyenne en rendement. Précocité de fin de groupe avec 1.8 points de plus que la moyenne.

Variétés en 3^{ème} année

DKC 4621 (Dekalb, 2013) est productive en pluriannuel même si elle est juste moyenne cette année. C'est une précoce dans cette série. Petit gabarit à insertion d'épis basse. Bon comportement face à *F.graminearum*.

Variétés en 2^{ème} année

COURTNEY (Advanta, D-2014) a une floraison particulièrement tardive mais finit avec une humidité moyenne. Est décevante cette année en rendement.

P9900 (Pioneer, 2014) est la plus productive sur deux ans et toujours en tête pour un caractère précoce dans cette série. Sa fragilité de tiges en fin de cycle (tiges creuses) et la présence éventuelle de *Fusarium graminearum* sont ses points faibles. A récolter tôt. Fait son rendement avec beaucoup de grains à petit pmg.

MAS 40F (Maïsadour, 2014) est vraiment tardive et ne peut pas convenir à toutes situations. Bon potentiel depuis deux ans. Verse signalée de par sa grande taille.

Variétés en 1^{ère} année

BORSALINO (Semences de France, 2014) fait un bon résultat avec 103.2 % de la moyenne pour une humidité de milieu de série. Plutôt gros grains. Pas de souci particulier. A suivre.

COMOTTI (Semences de France, 2015) semble moins intéressante, sans remarque particulière.

DKC5141 (Dekalb, 2015) est plutôt de fin de groupe pour l'humidité. Bon potentiel sans souci. Gros pmg. A suivre.

DS1120D (De Sangosse, 2015) a un potentiel du niveau de la moyenne pour une bonne précocité. A retester l'an prochain.

ES JASMINE (Euralis, 2015) est au niveau de la moyenne pour une précocité intéressante. Fait son rendement avec peu de grains à très gros pmg. Chahutée en fin de cycle avec un peu de verse, elle devra être retestée l'an prochain.

GREGORIO (Semences de France, 2015) n'apporte rien de particulier. Gros pmg.

HARMONIUM (Euralis, 2015) déçoit pour sa première année. Beaucoup de grains à très petit pmg. Très ou trop précoce dans cette série.

LG30444 (Limagrain, 2015) est la variété remarquée cette année dans ce groupe avec 105 % de la moyenne pour une humidité médiane. Régulière entre lieux. Pas de souci particulier. Grand gabarit. A essayer.

P9903 (Pioneer, 2015) est une démarque de P9900 avec un bon résultat dans cette série très exigeante car à fort potentiel. Plutôt début de groupe. Pas trop rustique.





RGT EMERIXX (Ragt, 2014), **RGT FUXXTER** (Ragt, 2015) et **RGT INIEXXTA** (Ragt, 2015) font un tir groupé au niveau du rendement en se plaçant sur la moyenne. Seule la précocité les différencie un peu. 2.2 points séparent Rgt Iniexxta la plus tardive à la récolte à Rgt Fuxxter. Semblent rustiques grâce à leur régularité entre lieux et leur tenue de tige. Rgt Fuxxter fait beaucoup de grains mais à très petit pmg. Rgt Emerixx à revoir.

SY KREON (Syngenta, 2015) et **SY OCTAVIUS** (Syngenta, 2015) ne sont pas à la hauteur des espérances en rendement. Sy Octavius à une tenue de tige limite, présente de gros pmg pour peu de grains

SY TRIADE (Syngenta, IT-2014) est la plus intéressante des trois avec un rendement dans la moyenne, sans souci particulier. Très gros pmg pour un petit nombre de grains. A retester en 2016.

ON SE RESUME	Maïs grain précoces (série 12)	Valeurs sûres	Variétés qui confirment	A essayer en 2015
	Précocité début de groupe		DKC4621 P9900	P9903 LG30444
	Précocité milieu de groupe	DKC4814 PIXXTOL		BORSALINO RGT EMERIXX SY TRIADE
	Précocité fin de groupe	MAS 51G		DKC5141

Dep	Lieu	Semis	Récolte	H2O	RDT
3	CONTIGNY	10/04/15	16/10/15	21.4838	148.0
38	SARDIEU	15/04/15	20/10/15	22.0869	153.3
38	THODURE	14/04/15	01/10/15	26.2321	145.6
68	BATTENHEIM	13/04/15	02/10/15	23.6355	153.7
68	URSCHENHEIM	14/04/15	07/10/15	23.5505	146.6



MAIS GRAIN : Caractérisez votre variété d'un seul coup d'œil

Centre-Est, Alsace et Sud-Est

Variétés 1/2 Tardives

Source des données : Réseau d'essais de Post-Inscription ARVALIS Institut du végétal, partenaires et UFS Section maïs

Carte d'identité

infos pluriannuelles																
	Variété	Représentant	Année inscription	Type grain	Productivité (%)			Précocité		Verse (%)	Structure épis		Tolérance aux maladies		infos pluriannuelles	
					2013	2014	2015	Floraison (écart moyenne du regroupement)	% humidité récolte (écart moyenne du regroupement)		Nb rangs	PMG	Tige creuse (%)	Helminthosporiose (note de 1 à 10)		Fusarium (% d'épis touchés)
Variétés de référence	DKC4795	Semences Dekalb/Monsanto	2009	cd;d	98.1	93.9	97.2	+2 j	-1.0 %	2.7 %	16.1	TG	8.5 %	2.7	5.5 %	
	DKC4814	Semences Dekalb/Monsanto	2011	cd;d	101.7	100.6	103.7	+1 j	+0.0 %	3.2 %	16.1	TG	11.8 %	2.6	9.1 %	
	PIXTOL	R.A.G.T. Semences	2011	d	103.8	101.5	101.4	-0 j	-0.1 %	3.7 %	17.3	G	1.8 %	3.6	5.3 %	
Rappel de séries adjacentes	FERARIX	R.A.G.T. Semences	2012	cd			94.6	+1 j	-1.4 %	4.6 %	14.6	TG	3.4 %	-	-	
	DKC5190	Semences Dekalb/Monsanto	2009	cd;d		100.5	103.9	+1 j	+1.0 %	4.7 %	16.7	TG	1.5 %	-	-	
Autres variétés	DKC5031	Semences Dekalb/Monsanto	2013	cd;d	103.6	100.3	100.1	+1 j	+1.8 %	2.1 %	15.3	TG	1.1 %	2.4	6.8 %	
	LG30491	LG, Marque de Limagrain	2011	d	102	98.1	100.7	-1 j	+0.2 %	6.0 %	14.1	TG	8.2 %	4.7	2.1 %	
	P9838	Pioneer Semences	RO-2012	d		98	98.4	+1 j	+0.5 %	3.2 %	15.3	G	2.3 %	2.7	6.7 %	
Variétés en 3 ^{ème} année	DKC4621	Semences Dekalb/Monsanto	2013	cd;d	103.8	101.8	99.4	+2 j	-0.5 %	6.4 %	16.8	TG	2.9 %	2.0	2.9 %	
Variétés en 2 ^{ème} année	COURTNEY	Advanta, Marque de Limagrain	DE-2013	d		100	97.5	-4 j	+0.1 %	1.7 %	15.5	TG	0.9 %	5.5	1.6 %	
	MAS 40F	Maisadour Semences	2014	d		103.3	101.9	-2 j	+2.4 %	6.8 %	17.3	G	2.2 %	5.6	6.9 %	
	P9900	Pioneer Semences	2014	cd;d		104.3	105.1	+1 j	-1.4 %	9.5 %	15.9	G	27.0 %	1.5	9.1 %	
Variétés en 1 ^{ère} année	BORSALINO	Semences de France	2014	cd;d			103.2	-2 j	+0.0 %	5.1 %	18.1	TG	2.6 %	-	-	
	COMOTTI	Semences de France	2015	d			99.4	+1 j	+0.3 %	4.5 %	16.9	G	5.0 %	-	-	
	DKC5141	Semences Dekalb/Monsanto	2015	cd;d			102.2	+1 j	+0.9 %	2.4 %	15.7	TG	0.0 %	-	-	
	DS11200	De Sangosse	2014	cd;d			100.3	-2 j	-0.8 %	5.4 %	15.2	G	9.7 %	-	-	
	ES JASMINE	Euralis Semences	2015	cd;d			99.9	+1 j	-1.1 %	11.4 %	15.3	TG	7.7 %	-	-	
	GREGORIO	Semences de France	2015	cd			97.8	-1 j	+0.2 %	7.3 %	15.2	TG	1.2 %	-	-	
	HARMONIUM	Euralis Semences	2015	cd;d			96.1	+0 j	-1.4 %	2.4 %	15.1	G	4.8 %	-	-	
	LG30444	LG, Marque de Limagrain	2015	cd;d			105.0	-2 j	-0.5 %	4.5 %	14.8	TG	13.8 %	-	-	
	P9903	Pioneer Semences	2015	cd;d			102.0	+1 j	-0.3 %	7.4 %	15.4	TG	10.2 %	-	-	
	RGT EMERIXX	R.A.G.T. Semences	2014	cd;d			100.3	+2 j	+0.2 %	3.4 %	15.3	TG	2.2 %	-	-	
	RGT FUXXTER	R.A.G.T. Semences	2015	cd;d			99.0	+1 j	-0.4 %	4.3 %	16.0	G	14.2 %	-	-	
	RGT INIEXXTA	R.A.G.T. Semences	2015	cd;d			100.1	-1 j	+1.8 %	2.3 %	16.2	TG	1.7 %	-	-	
	SYKREON	Syngenta France SAS	2014	cd;d			95.3	-1 j	+0.1 %	4.0 %	15.2	G	0.6 %	-	-	
	SY OCTAVIUS	Syngenta France SAS	2015	cd;d			94.9	+1 j	-0.6 %	10.5 %	14.8	TG	0.3 %	-	-	
	SY TRIADE	Syngenta France SAS	IT-2014	d			100.6	-1 j	+0.1 %	4.0 %	14.3	TG	4.7 %	-	-	
Moyenne du regroupement					139.7 qx/ha	130.0 qx/ha	149.4 qx/ha	3 essais 4 juillet	4 essais 23.4 % H2O	9 essais 4.9 %	4 essais 15.7	6 essais 373 g	16 essais 3.1	27 essais 5.0 %		

PMG
g
TP < 270
270 < P < 300
300 < M < 330
330 < G < 360
TG > 360

Verse
%
0% ≤ X < 2.5%
2.5% ≤ X < 5%
5% ≤ X < 7.5%
7.5% ≤ X < 10%
10% ≤ X


Rendement
% de la moyenne des essais
≥ 104 %
101% ≤ X < 104%
99% ≤ X < 101%
96% ≤ X < 99%
≤ 96 %

Echelle de notation :
++
+
+/-
-
--

2015	Retenus pour verse
16	CHENON
38	THODURE
40	SOLFIERNO
38	SARDIEU
47	DURAS
64	GER
68	MORLAAS
68	URSCHENHEIM
86	CHATEAU LARCHER
86	MAGNE

2015	Retenus pour rendement et précocité
3	CONTIGNY
38	SARDIEU
38	THODURE
68	BATTENHEIM
68	URSCHENHEIM

Les résultats des variétés GRAIN tardives Série S 15



Variétés de maïs-grain tardives S15

Ce regroupement de 7 essais (2 dans l'Ain, 4 dans la Drôme, 1 dans le Rhône), présente un rendement de 147.8 q/ha. En plaine de l'Ain et de Lyon, les stress estivaux ont impacté les potentiels de plantes. Ce fût moins le cas en plaine de Valence. Les humidités de récolte sont basses (23.6% en moyenne).

Variétés de référence

AAPOTHEOZ (Advanta, IT-2010) est une variété présente depuis 5 ans dans les essais. Elle se démarque par ses très bonnes performances pluriannuelles : potentiel légèrement au-dessus de la moyenne, mais très régulier dans le temps. Son grand gabarit a induit un peu de verse cette année. Epi long, gros PMG.

DKC5190 (Dekalb, 2009) Maïs très typé grain. Son potentiel est très régulier. Il s'est bien comporté face aux conditions de production de 2015. C'est une valeur sûre.

ZOOM (Euralis, 2012) : Toujours présente dans le trio de tête depuis 4 ans. Elle confirme cette année encore ses bonnes performances pluriannuelles. Même si le champignon était peu présent cette année, soulignons tout de même qu'il faut être vigilant quant à *Fusarium graminearum* et ne pas laisser trainer les plantes aux champs ;

DKC 5783 et **DKC 4814** figurent parmi ce regroupement en tant que témoins de précocité et de tardiveté.

Autres variétés

DKC 4522 (Dekalb, 2012) Plante assez courte. Bon comportement dans les conditions de l'année. Ses performances sont donc légèrement meilleures que celles des années antérieures.

P0222 (Pioneer, IT 2010), présente des résultats en deçà des années antérieures. Elle n'est plus commercialisée.

P0725 (Pioneer, IT 2011) et **P0837** (Pioneer, IT 2011) sont nettement en retrait dans le regroupement sud-est. Le

stress hydrique, accentué par les fortes chaleurs, à la floraison en sont la cause. Elles restent malgré tout des variétés très productives.

Variétés en 2^{ème} année

DKC5632 (Dekalb, 2014), **DKC 5830** (Dekalb, IT 2012), sont dans les meilleurs potentiels depuis 3 ans. Variétés très typées grain, au gabarit court et au gros PMG. La seconde est très tardive, à positionner dans les situations les plus chaudes.

LG 30494 (Limagrain 2013) ne concurrence pas les variétés très productives de la série.

SY SAVIO (Syngenta, 2014) et **SY SENKO** (Syngenta, 2014) sont des variétés de début de groupe. Elles apportent de la précocité mais peu de potentiel. Attention, elles peuvent être sujette à la verse.

Variétés en 1^{ère} année

DKC 5741 (Dekalb, 2015), Assez tardive pour le groupe, elle s'est montrée assez régulière dans les différents sites d'essais. Très bonne tenue de tige.



LG30525 (Limagrain, 2015) est une variété qui a tendance à apprécier les sommes de températures élevées. Elle est à réserver dans les meilleures situations. C'est un grand gabarit.

MAS 56A (Maisadour, 2015). Son potentiel a été fortement affecté par de la verse sur la quasi-totalité des essais.

MEXINI (RAGT, IT 2014) est intéressante pour son bon rapport précocité/rendement. Elle s'est montrée très régulière sur ces deux paramètres. Aucun de problèmes agronomiques observés.

ON SE RESUME	Maïs grain tardives (S15)	Valeurs sûres	Variétés qui confirment	A essayer en 2016
	Précocité début de groupe	AAPOTHEOZ,		MEXINI, LG 30525
	Précocité milieu de groupe	ZOOM, DKC5190,	DKC5632	
	Précocité fin de groupe	P0725, P0837	DKC5830	

Dep	Lieu	Semis	Récolte	H2O	RDT
1	BOURG-SAINT-CHRISTOPHE	13/04/15	02/10/15	22.2073	153.6
1	SAINT-AURICE-DE-GOURDANS	13/04/15	29/09/15	29.5183	142.1
26	ALIXAN	07/04/15	23/09/15	25.5597	167.4
26	SAINT-PAUL-LES-ROMANS	23/04/15	09/10/15	24.3937	106.7
26	ETOILE-SUR-RHONE	08/04/15	23/09/15	19.5344	171.8
26	VALENCE	08/04/15	21/09/15	21.1143	159.7
69	LYON SATOLAS AEROPORT	14/04/15	30/09/15	22.7758	133.1



MAÏS GRAIN : Caractérisez votre variété d'un seul coup d'œil

Sud-Est et Vallée du Rhône

Variétés Tardives (15)

Source des données : Réseau d'essais de Post-Inscription ARVALIS Institut du végétal, partenaires et UFS Section maïs

Carte d'identité

	Variété	Représentant	Année inscription	Type grain	Productivité (%)			Précocité		Verse (%)	Structure épis		Tige creuse (%)		Infos pluriannuelles	
					2013	2014	2015	Floraison (écart moyenne du regroupement)	% humidité récolte (écart moyenne du regroupement)		Nb rangs	PMG			Tolérance aux maladies	Fusarium graminearum (% d'épis touchés)
Variétés de référence	DKC5190	Semences Dekalb/Monsanto	2009	cd.d	100.8	99.6	101.7	-2 j	-1.2 %	8.1 %	17.3	TG	1.5 %	-	-	2.6 %
	ZOOM	Euralis Semences	2012	d	104.6	102.1	104.2	-1 j	+0.4 %	6.7 %	18.1	TG	4.4 %	-	-	4.1 %
	AAPOTHEOZ	Advanta, Marque de Limagrain	IT-2010	d	101.5	101.3	98.4	+1 j	-1.2 %	15.8 %	14.6	TG	2.7 %	-	-	4.7 %
Rappel de séries adjacentes	DKC5783	Semences Dekalb/Monsanto	2004	d	99.8	99.4	96.9	+0 j	+1.3 %	7.3 %	18.6	G	4.8 %	-	-	6.2 %
	DKC4814	Semences Dekalb/Monsanto	2011	cd.d	98.5	98.5	100.0	-3 j	-2.1 %	4.8 %	16.6	TG	1.8 %	-	-	-
Autres variétés	DKC5222	Semences Dekalb/Monsanto	2012	cd.d	101.6	98.7	100.6	-1 j	+0.6 %	6.5 %	17.1	TG	1.6 %	-	-	5.7 %
	P0222	Pioneer Semences	IT-2010	d	100.2	98.7	95.9	-1 j	-1.1 %	11.7 %	16.3	G	1.2 %	-	-	6.7 %
	P0725	Pioneer Semences	IT-2011	d	102.8	103.1	96.8	+2 j	+0.2 %	10.8 %	16.2	TG	0.7 %	-	-	3.0 %
	P0837	Pioneer Semences	IT-2011	d	103.8	103.8	99.9	+0 j	+1.5 %	10.6 %	16.6	TG	3.6 %	-	-	2.0 %
Variétés en 2 ^{ème} année	DKC5632	Semences Dekalb/Monsanto	2014	d	102.4	102.4	107.1	-1 j	+1.4 %	9.2 %	17.2	TG	0.4 %	-	-	6.3 %
	DKC5830	Semences Dekalb/Monsanto	IT-2012	d	104.4	107.0	107.0	+0 j	+2.8 %	5.9 %	16.8	TG	2.0 %	-	-	8.3 %
	LG30494	LG, Marque de Limagrain	2013	d	100	100	95.3	-0 j	-1.6 %	10.5 %	15.0	TG	0.5 %	-	-	-
	SY SAVIO	Syngenta France SAS	2014	cd.d	101.4	101.4	97.2	+3 j	-1.2 %	12.6 %	15.7	TG	4.1 %	-	-	-
	SY SENKO	Syngenta France SAS	2014	d	99.9	99.9	99.3	+1 j	-1.6 %	14.8 %	14.6	TG	4.6 %	-	-	-
Variétés en 1 ^{ère} année	DKC5741	Semences Dekalb/Monsanto	2015	cd.d			103.5	-0 j	+2.5 %	3.7 %	16.9	TG	0.2 %	-	-	-
	LG30525	LG, Marque de Limagrain	2015	d			99.6	+0 j	-1.4 %	10.9 %	14.7	TG	1.8 %	-	-	-
	MAS 56A	Maisadour Semences	2015	d			94.3	+2 j	+1.6 %	37.4 %	17.2	G	26.5 %	-	-	-
	MEXINI	R.A.G.T. Semences	IT-2014	d			102.4	-0 j	-0.9 %	12.4 %	16.2	TG	4.7 %	-	-	-
Moyenne du regroupement					136.9 qx/ha	142.7 qx/ha	147.8 qx/ha	3 essais 1 juillet	7 essais 23.6 %H20	5 essais 11.1 %	6 essais 16.4	11 essais 342 g	5 essais 3.7 %	19 essais 5.0 %		

PMG	g
TP < 270	
270 < P < 300	
300 < M < 330	
330 < G < 360	
TG > 360	

Verse	%
0% ≤ X < 2.5%	
2.5% ≤ X < 5%	
5% ≤ X < 7.5%	
7.5% ≤ X < 10%	
10% ≤ X	


Rendement	% de la moyenne des essais
≥ 104 %	
101% ≤ X < 104%	
99% ≤ X < 101%	
96% ≤ X < 99%	
≤ 96 %	

Echelle de notation :	
++	
+	
+/-	
-	
--	

2015	Retenus pour verse
1	BOURG ST CHRISTOPHE
26	AUXAN
26	ETOLE SUR RHONE
26	VALENCE
69	PUSIGNAN

2015	Retenus pour rendement et précocité
1	BOURG ST CHRISTOPHE
26	AUXAN
26	ETOLE SUR RHONE
26	ST PAUL LES ROVANS
26	VALENCE
69	PUSIGNAN

Les résultats des variétés GRAIN très tardives Série S 16



Variétés de maïs-grain très tardives S16

Le réseau regroupement, constitué de 6 essais, est centré sur la Drôme. Le potentiel observé est de 152.9 qx/ha, avec 26.7% d'humidité moyenne. Les aléa-climatiques n'ont pas été aussi intenses que dans le nord de la région et se matériel génétique a pu en bénéficier. Très peu de variétés sont inscrites.

Variétés de référence

DKC 5783 (Dekalb, 2004) : Variété de début de groupe, dans la moyenne en potentiel. Valeur sûre, elle est régulière au fil des ans. Beaucoup de grains/m² grâce à un nombre de rangs élevé

CORETTA (Caussade, IT 2007) Variété de milieu de groupe dont les performances commencent à s'éroder.

LG 30597 (Limagrain, IT 2010) Grand maïs à insertion d'épi très haute. Epis assez long avec peu de rangs. Confirme les bons résultats acquis depuis 3 ans.

Variétés en 2^{ème} année


MILOXAN (RAGT, IT 2013), variété la plus tardive de ce petit regroupement. Confirme son potentiel entrevu l'année passée.

ON SE RESUME	Maïs grain très tardives (S16)	Valeurs sûres	Variétés qui confirment	A essayer en 2016
	Précocité début de groupe	DKC 5783		
	Précocité milieu de groupe			
	Précocité fin de groupe	LG30597	MILOXAN,	

Dep	Lieu	Semis	Récolte	H2O	RDT
1	SAINT-MAURICE-DE-GOURDANS	13/04/15	29/09/15	31.442	141.9
26	ALIXAN	07/04/15	23/09/15	27.6002	171.7
26	SAINT-PAUL-LES-ROMANS	23/04/15	09/10/15	26.0342	104.1
26	ALLEX	15/04/15	15/10/15	25.2158	166.6
26	ETOILE-SUR-RHONE	08/04/15	23/09/15	24.5791	178.1
26	VALENCE	08/04/15	21/09/15	25.3806	154.7



Résultats 2015 de rendements et de précocité à la récolte



MAIS GRAIN : Caractérisez votre variété d'un seul coup d'œil
Sud-Est et Vallée du Rhône
Variétés Très Tardives (16)

Source des données : Réseau d'essais de Post-Inscription ARVALIS Institut du végétal, partenaires et UFS Section maïs

PMG
g
TP < 270
270 < P < 300
300 < M < 330
330 < G < 360
TG > 360

Verse
%
0% ≤ X < 2.5%
2.5% ≤ X < 5%
5% ≤ X < 7.5%
7.5% ≤ X < 10%
10% ≤ X

Rendement
% de la moyenne des essais
≥ 104 %
101% ≤ X < 104%
99% ≤ X < 101%
96% ≤ X < 99%
≤ 96 %

Echelle de notation :
++
+
+/-
-

2015	Retenus pour rendement et précécité
1	ST MAURICE DE GOURDAN
26	ALEXAN
26	ALEX
26	ETOILE SUR RHONE
26	VALENCE
31	CALMONT
33	ST MEDARD DE GUZERES
82	BIOULE

2015	Retenus pour verse
1	ST MAURICE DE GOURDAN
26	ALEXAN
26	ALEX
26	ETOILE SUR RHONE
26	VALENCE

CHOIX DES VARIETES DE MAIS GRAIN POUR 2016 DANS LE GRAND EST

Besoins en température du semis à 32% d'humidité (estimatif)	Variétés confirmées depuis plusieurs années	Variétés nouvelles à essayer sur de petites surfaces		1	2	3	4	5	6
>2040°	DKC5783 LG 30597 MILOXAN		TARDIVES  PRECOCES						
2000° à 2040°	DKC5783	DKC5632 DKC5830							
1950° à 2000°	AAPOTHEOZ DKC5190 DKC5632 DKC5830 P0725 P0837 ZOOM	MEXINI LG 30525							
1920° à 1940°	DKC4814 MAS 51G PIXXTOL	BORSALINO DKC5141 RGT EMERIXX SY TRIADE							
1900° à 1920°	DKC4621 P9900	LG30444 P9903							
1900°	DKC4590	DKC4541 SY IZOAR							
1860° à 1900°	FERARIXX OBIXX DKC4522 MARTELI CS	JACUZI CS							
1825°	DKC3930 DKC3931 ES GALLERY KONFERENS RGT CONEXXION	DKC3938 RGT DUBLIXX							
1760° à 1800°	P8816 RGT PROVEXX								
1750°	ADEVEY KROISSANS	DKC3939							
1725°	DKC3730 KONKORDANS MAS 29T	ES CREATIVE KONFLUENS							
1670°	KIPARIS RAMSES	KOLOSSALIS LG30215							

 Se limiter à 50% des surfaces pour ce type de variétés « tardives » pour le secteur

- 1 : Vallée du Rhône.
 2 : Plaine du Rhône - Plaine de l'Ain – Bas Bugey
 3 : Bresse - Dombes - Côtière de Dombes - Marais de Bourgoin - Combes de Savoie - Hardt – Plaine du Rhin – Finage – Plaine de Chemin
 4 : Bordure du Sundgau – Ried – Kochersberg - Terres Froides - Plateau de Chambaran - Plaine de Bièvre – vallée de l'Ognon
 5 : Sundgau – Pays de Hanau – Outre forêt - Nord de la Haute-Saône

VARIETES DE MAIS-FOURRAGE

Variétés précoces Série SB

27 variétés de maïs fourrage précoces (SB) ont été évaluées dans le réseau VPI Arvalis-Ufs 2015 dont 9 pour la première année. Les variétés de référence de la série SB sont RONALDINIO / LG 30275 / GEOX. 24 essais SB dans toute la France ont été regroupés en fonction du potentiel : 8 essais à potentiel élevé (18.8 t/ha à 34.2%), 8 essais à potentiel moyen (16.3 t/ha à 32.5%) et 8 essais à potentiel faible (12.5 t/ha à 36.2%).

Variétés de référence

RONALDINIO (Semences de France, 2007), décroche en potentiel face aux variétés nouvellement inscrites.

LG 30275 (Limagrain, 2010): précocité fin de groupe, bonne vigueur au départ, rendement régulier à 102.7 % sur 3 ans, en retrait en 2015, moins bien en situation de stress hydrique, valeur alimentaire moyenne avec bon Dinag, bonne tenue de tige.

GEOXX (RAGT, 2010), reste une variété au potentiel moyen tout en étant précoce. Elle perd du terrain face aux nouvelles.

Variétés en 3^{ème} année

ES ALBATROS (Euralis, DE-2012), présente un niveau de potentiel moyen dans les situations favorables, mais il s'écroule dès lors que les conditions deviennent plus difficiles. Valeur alimentaire plutôt faible.

ES TAROCK (Euralis, 2013): précocité milieu de groupe, bonne vigueur au départ, rendement régulier à 102.8 % sur 3 ans, valeur alimentaire moyenne avec Dinag faible, un peu sensible à la verse (2014)

JULIETT (Advanta, 2013): précocité fin de groupe, bonne vigueur au départ, bon rendement à 101.9 % sur 3 ans, en retrait en 2015, valeur alimentaire moyenne (faible en amidon en 2015), bonne tenue de tige.

LG 30260 (Limagrain, 2013): précocité milieu de groupe, bonne vigueur au départ, rendement à 101.7 % sur 3 ans, moins bien en situation de stress hydrique, valeur alimentaire moyenne avec profil équilibré, bonne tenue de tige.

NIKLAS (Advanta, DE-2012) est dans la moyenne sur tous les critères.

Variétés en 2^{ème} année

BELCANTO (Semences de France, 2014) : précocité début/milieu de groupe, bonne vigueur au départ, rendement à 102.2 % sur 2 ans, valeur alimentaire assez faible, bonne tenue de tige.

CASCADINIO (KWS, DE-2013), est en dessous du potentiel des variétés concurrentes quel que soit le potentiel des parcelles.

JUVENTO (Semences de France, 2014) est la plus précoce du groupe. Elle développe un tonnage moyen et sa valeur alimentaire est bonne (beaucoup d'amidon)

KROQUIS (KWS, 2014): précocité milieu de groupe, bonne vigueur au départ, rendement régulier sur 2 ans, bien en situation de stress hydrique, valeur alimentaire moyenne (faible en 2015), bonne tenue de tige,

LG30274 (LG, 2013), est dans la moyenne en précocité et rendement. Régulière depuis deux ans elle se caractérise également par une bonne valeur alimentaire, basée sur sa digestibilité des tiges et des feuilles.

SY FANATIC (Syngenta, 2014): précocité fin de groupe, bonne vigueur au départ, Au potentiel élevé depuis 2 ans, elle présente également une bonne valeur alimentaire avec profil équilibré, bonne tenue de tige.

VESTAR (Jouffray-Drillaud, 2014) et **SUNSTAR** (Advanta, DE-2012), ne sont pas au niveau des nouvelles variétés inscrites depuis 3 ans.

Variétés en 1^{ère} année

DKC3553 (Dekalb, 2015) présente un rendement moyen, compensé par sa précocité. Elle sort bien son épingle du jeu en situations plus restrictives, tout en ayant une valeur alimentaire correcte et une bonne tenue de tige.

DKC3640 (Dekalb, IT-2014), n'apporte pas le potentiel escompté au regard de sa tardiveté. De surcroît, sa valeur UFL figure parmi les plus faibles.

KALIDEAS (KWS, 2015): précocité milieu de groupe, bonne vigueur au départ, rendement à 102.5 % en 2015, bien en situation de stress hydrique, bonne valeur alimentaire, bonne tenue de tige,

LG30248 (LG, 2015): précocité début de groupe, bonne vigueur au départ, bonne valeur alimentaire, bonne tenue de tige.

LG30291 (LG, CZ-2014): précocité fin de groupe, bonne vigueur au départ, valeur alimentaire moyenne. Attention elle peut être sujette à de la verse.

NIKITA (Advanta, CZ-2014): précocité milieu/fin de groupe, bonne vigueur au départ, rendement à 102.4 % en 2015, valeur alimentaire assez faible, bonne tenue de tige)

RIVALDINIO KWS (KWS, DE-2013), bien en situation hydrique restrictives, elle rentre dans le rang en haut potentiel. Bonne valeur UFL basée sur une grande quantité d'amidon.

SY ALTITUDE (Syngenta, DE-2014) est très tardive et au potentiel moyen.

SY MADRAS (Syngenta, 2015): précocité milieu de groupe, bonne vigueur au départ, rendement à 103.1 % en 2015, bien en situation de stress hydrique, valeur alimentaire moyenne, bonne tenue de tige.

Carte d'identité

MAIS FOURRAGE : Caractériser votre variété d'un seul coup d'œil

Nord et Est

Variétés Précoces (SB)

Source des données : Réseau d'essais de Post-Inscription ARVALIS Institut du végétal, partenaires et UFS Section maïs

2015													
Variété	Représentant	Année inscription	Type grain	Productivité (%)			Précocité		Verse (%)	Qualité fourrage Toutes zones			
				2013	2014	2015	Floraison (écart moyen du regroupement)	% MS récolte (écart moyenne du regroupement nt)		UFL (%)	Dinag (écart moyen du regroupement)	% Amidon dans la MS (%)	
Témoins	RONALDINIO	Semences de France	2007	c.cd	95.9	95.6	98.3	-3 j	+1.5 %	4.84	100.4	-0.3	107.2
	LG30275	LG, Marque de Limagrain	2010	c.cd	103.2	104.8	99.0	+0 j	-0.3 %	5.96	99.7	+0.7	87.8
	GEOXX	R.A.G.T. Semences	2010	c.cd	100.8	99.5	100.2	-1 j	+0.9 %	4.36	98.7	-1.1	101.7
Rappel séries adjacentes	EMILY	Advanta, Marque de Limagrain	2011	c.cd			100.7	-0 j	+2.9 %	5.38	100.4	+0.5	99.4
	ES CHARTER	Euralis Semences	2010	c.cd			97.8	+3 j	-1.9 %	4.06	99.0	-1.7	94.4
3ème année	ES ALBATROS	Euralis Semences	DE-2012	c.cd	105.7	102.3	94.9	+0 j	-0.4 %	4.16	99.4	-0.4	101.6
	ES TAROCK	Euralis Semences	2013	cd	101.4	105.7	101.0	+0 j	+0.9 %	7.45	99.7	-1.3	102.9
	JULIETT	Advanta, Marque de Limagrain	2013	cc	101.4	104.5	100.9	-1 j	+0.0 %	5.99	99.2	-0.5	87.7
	LG30260	LG, Marque de Limagrain	2013	c.cd	101.3	102.1	97.8	+0 j	+0.3 %	3.68	100.1	+0.2	101.6
	NIKLAS	Advanta, Marque de Limagrain	DE-2012	c.cd	103.1	97.4	101.5	-0 j	+0.8 %	5.06	100.2	-0.0	101.4
2ème année	BELCANTO	Semences de France	2014	cc		101.2	101.5	-0 j	+1.3 %	4.46	98.7	-1.4	101.8
	CASCADINIO	KWS Mais France	DE-2013	c.cd	100.8	95.9	98.9	+0 j	-1.0 %	7.42	99.5	-1.5	99.8
	JUVENTO	Semences de France	2014	c.cd	102.4	99.6	99.6	-1 j	+2.5 %	7.56	101.6	+0.8	109.9
	KROQUIS	KWS Mais France	2014	c.cd	102.5	104.0	101.0	-1 j	-0.7 %	5.51	98.7	-1.5	101.9
	LG30274	LG, Marque de Limagrain	2013	cd	102.9	101.7	101.7	-0 j	-0.2 %	5.76	99.5	+0.6	91.6
	SUNSTAR	Advanta, Marque de Limagrain	DE-2012	c.cd	100.1	99.4	99.4	-0 j	+0.5 %	3.13	100.8	+1.1	101.3
	SY FANATIC	Syngenta France SAS	2014	c.cd	101.4	99.8	99.8	+2 j	-1.1 %	4	101.1	+0.8	99.0
	VEMSTAR	Jouffray - Drillaud Sem.	2014	c.cd	96.8	99.6	99.6	+1 j	-0.3 %	3.82	102.2	+1.7	101.2
	DKC3553	Semences Dekalb/Monsanto	2015	c.cd		101.3	101.3	+1 j	+0.3 %	2.43	100.9	+1.1	105.8
	DKC3640	Semences Dekalb/Monsanto	IT-2014	cd.d		97.3	97.3	-1 j	-2.6 %	4.96	98.9	-0.7	98.3
1ère année	KALIDEAS	KWS Mais France	2015	c.cd	102.5	102.5	102.5	-1 j	+0.0 %	6	101.2	+2.1	106.0
	LG30248	LG, Marque de Limagrain	2015	c.cd		99.6	99.6	-2 j	+1.4 %	5.29	101.2	+1.8	101.1
	LG30291	LG, Marque de Limagrain	CZ-2014	cd		99.7	99.7	+0 j	-2.2 %	8.42	99.6	+1.1	91.2
	NIKITA	Advanta, Marque de Limagrain	CZ-2014	c.cd		100.3	100.3	-0 j	-1.0 %	4.41	99.0	-0.2	93.2
	RIVALDINIO KWS	KWS Mais France	DE-2013	c.cd		101.7	101.7	+1 j	+0.7 %	4.9	100.2	-1.9	112.5
	SY AL TITUDE	Syngenta France SAS	DE-2014	c.cd		100.9	100.9	-1 j	-1.7 %	5.64	100.2	-0.0	99.4
	SY MADRAS	Syngenta France SAS	2015	c.cd			103.1	+0 j	-0.4 %	3.68	100.2	+0.2	100.5
Moyenne du regroupement				100 % =	17.3 t/ha	17.4 t/ha	12.5 t/ha	2 essais	8 essais	100 % =	8 essais	100 % =	
									5.1%	0.98	56.0	34.5 %	

Verse	UFL
%	% de la moyenne des essais
0% ≤ X < 2.5%	X ≥ 104 %
2.5% ≤ X < 5%	101% ≤ X < 104%
5% ≤ X < 7.5%	99% ≤ X < 101%
7.5% ≤ X < 10%	96% ≤ X < 99%
10% ≤ X	X ≤ 96 %

Rendement
% de la moyenne des essais
X ≥ 104 %
101% ≤ X < 104%
99% ≤ X < 101%
96% ≤ X < 99%
X ≤ 96 %

Echelle de notation :
++
+
+/-
-
--

2015	Retenus pour verse
35	PLOMODIERN
51	LA CHAPELLE JANSON
55	ST GERMAIN EN COGLES
56	BIGNAN
85	HERBERGEMENT
57	JUVELIZE

2015	Retenus pour rendement et précocité
35	GRAND FOURGERAY
51	BERZIEUX
55	FREMERVILLE SS LES CÔTES
56	MAISONNEUILLE
57	BURTONCOURT
57	JUVELIZE

Variétés demi-précoces Série SC

15 variétés de type ½ précoce (SC) ont été évaluées dans le réseau VPI Arvalis-Ufs 2015 dont 7 pour la première année. Les variétés de référence de la série SC sont LG3264 / ES CHARTER / BALBOA. 15 essais SC dans toute la France ont été regroupés en fonction du potentiel : 9 essais à potentiel élevé (19.0 t/ha à 34.4%) et 6 essais à potentiel faible (13.0 t/ha à 32.4%).

Variétés de référence

LG3264 (LG, 2007) précocité milieu de groupe, rendement régulier sur 3 ans, bonne valeur alimentaire avec profil équilibré, bonne tenue de tige.

ES CHARTER (Euralis, 2010), commence à être dépassée face aux jeunes variétés.

BALBOA (Semences de France, 2012) précocité milieu de groupe, bonne vigueur au départ, rendement régulier à 101.6 % sur 3 ans, bien en situation de stress hydrique, bonne valeur alimentaire avec profil équilibré, bonne tenue de tige.

Autres variétés

INDEXX (RAGT, 2011) a un potentiel et une valeur UFL moyenne (partie tige/feuilles peu digestible). De surcroît elle peut présenter des symptômes de verse.

PYTAGOR (Semences de France, 2012) : précocité milieu de groupe, bonne vigueur au départ, rendement à 101.0 % sur 3 ans, moins bien en situation de stress hydrique, bonne valeur alimentaire avec profil équilibré, bonne tenue de tige.

Variétés en 3^{ème} année

IDALGO (Semences de France, 2013) : précocité milieu de groupe, bonne vigueur au départ, rendement à

100.9% sur 3 ans, bonne valeur alimentaire avec profil équilibré, un peu sensible à la verse.

Variétés en 2^{ème} année

AGRO-VITALLO (KWS, DE-2013) : précocité début de groupe, vigueur au départ faible, rendement à 101.6 % sur 2 ans, bien en situation de stress hydrique, valeur alimentaire moyenne avec faible

Variétés en 1^{ère} année

BAMACO (Semences de France, 2015) : précocité milieu de groupe, bonne vigueur au départ, rendement à 101.8 % en 2015, bien en situation de stress hydrique, bonne valeur alimentaire avec profil équilibré, bonne tenue de tige.




ES PEPONNE (Euralis, DE-2014): précocité milieu de groupe, rendement à 103.9 % en 2015 (en situation optimales ou restrictives en eau), valeur alimentaire assez faible, un peu sensible à la verse.

KALORIAS (KWS, SK-2014) et **SY CAMPONA** (Syngenta, DE-2014) sont deux variétés de fin de série, mais un peu faiblards en potentiel au regard de leur précocité.

SESAME : précocité début de groupe, bonne vigueur au départ, rendement à 101.0 % en 2015, bien en situation de stress hydrique, bonne valeur alimentaire avec bon Dinag, un peu sensible à la verse.

SIRIANI CS (Caussade, IT-2014) et **SY MASSYTOP** (Jouffray Drillaud, 2014) sont deux variétés de fin de groupe au rendement moyen. SIRIANI CS a une valeur UFL faible au contraire de SY MASSYTOP

ON SE RESUME	Maïs grain ½ précoces (série SC)	Valeurs sûres	Variétés qui confirment	A essayer en 2015
	Précocité début de groupe	LG3264	AGRO-VITALLO IDALGO	SESAME
	Précocité milieu de groupe	BALBOA PYTAGOR		BAMACO
	Précocité fin de groupe			ES PEPONNE KALORIAS



MAIS FOURRAGE : Caractérisez votre variété d'un seul coup d'œil
Nord-Est et Centre-Est
Variétés 1/2 Précoces (SC)

Source des données : Réseau d'essais de Post-Inscription ARVALIS Institut du végétal, partenaires et UFS Section maïs

Carte d'identité

2015													
Variété	Représentant	Année inscription	Type grain	Productivité (%)			Précocité		Verse (%)	Qualité fourrage Toutes zones			
				2013	2014	2015	Floraison (écart moyenne du regroupement)	% MS récolte (écart moyenne du regroupement)		UFL (%)	Dinag (écart moyenne du regroupement)	% Amidon dans la MS (%)	
Témoins	LG3264	LG, Marque de Limagrain	2007	c.cd	97.9	100.815	101.2	-	+ 0.3 %	10.16	100.4	+ 0.2	93.7
	ES CHARTER	Euralis Semences	2010	c.cd	101.8	95.6143	99.2	-	+ 0.2 %	4.22	100.0	- 1.0	97.9
	BALBOA	Semences de France	2012	c.cd	103.5	101.215	100.3	-	- 0.1 %	8.87	101.2	+ 1.1	100.9
Rappel séries adjacentes	LG30275	LG, Marque de Limagrain	2010	c.cd	102.1	100.82	96.5	-	+ 1.3 %	14.95	101.4	+ 1.5	98.7
Autres variétés	INDEXX	R.A.G.T. Semences	2011	c.cd	97.9	100.368	99.5	-	+ 0.5 %	13.17	98.7	- 0.8	100.2
	PYTAGOR	Semences de France	2012	c.cd	103.5	102.167	97.4	-	+ 0.5 %	5.76	99.2	+ 0.2	98.7
3ème année	IDALGO	Semences de France	2013	c.cd	103.9	99.615	99.3	-	- 0.8 %	12.25	101.4	+ 0.5	111.2
2ème année	AGRO VITALLO	KWS Maïs France	DE-2013	c.cd		100.384	102.8	-	+ 1.7 %	12.29	99.4	- 0.9	100.4
1ère année	BAMACO	Semences de France	2015	c.cd			103.2	-	+ 0.0 %	7.52	101.5	+ 1.8	106.9
	ES PEPPONE	Euralis Semences	DE-2014	cd			101.6	-	- 0.6 %	13.52	98.7	- 1.9	95.0
	KALORIAS	KWS Maïs France	SK-2014	cd			97.3	-	- 1.5 %	8.69	98.7	- 1.1	98.6
	SESAME	Semences de France	2015	c.cd			102.3	-	+ 1.0 %	12.3	100.6	+ 1.5	105.8
	SIRIANI CS	Caussade Semences	IT-2014	c.cd			101.0	-	- 0.9 %	12.06	96.4	- 3.1	92.5
	SY CAMPONA	Syngenta France SAS	DE-2014	c.cd			98.4	-	- 0.4 %	24.61	101.0	+ 0.7	98.2
	SY MASSYTOP	Jouffray - Drillaud Sem.	2014	c.cd			100.0	-	- 1.4 %	3.7	101.3	+ 1.5	101.2
Moyenne du regroupement				100 % =	14.6 t/ha	16.3 t/ha	13.0 t/ha	6 essais		5 essais	100 % =	8 essais	100 % =
								32.4 % MS		10.9%	0.96	51.0	35.0 %

Verse	UFL
%	% de la moyenne des essais
0% ≤ X < 2.5%	X ≥ 104 %
2.5% ≤ X < 5%	101% ≤ X < 104%
5% ≤ X < 7.5%	99% ≤ X < 101%
7.5% ≤ X < 10%	96% ≤ X < 99%
10% ≤ X	X ≤ 96 %

Rendement
% de la moyenne des essais
X ≥ 104 %
101% ≤ X < 104%
99% ≤ X < 101%
96% ≤ X < 99%
X ≤ 96 %

Echelle de notation :

++
+
+/-
-
--

2015	Retenus pour verse et précocité	2015	Retenus pour verse
53 DENAZE		41 ST LEONARD EN BEAUCE	
55 MARCHEVILLE EN WOEVRE		49 DAUMERAY	
56 ROUVROIS SUR MEUSE		53 DENAZE	
57 METTING		68 RUSTENHART	
61 LA MESNIERE		85 LA TARDIERE	
85 NALLIERS			

Variétés demi-précoces à demi-tardives

Série SD

12 variétés de type ½ précoce à ½ tardives (SD) ont été évaluées dans le réseau VPI Arvalis-Ufs 2015 dont seulement 3 pour la première année. Les variétés de référence de la série SD sont SHEXXPIR / PALMER / FUTURIXX/P0319 ainsi que LG3264 en tant que témoin de précocité. Parmi les 12 essais du regroupement, on trouve 3 essais en région Est. Le potentiel moyen est correct, sans plus, avec 17.2 t MS/ha pour une teneur en matière sèche de 33%.

Variétés de référence

SHEXXPIR (Ragt, 2009) Hybride de taille moyenne à insertion haute, elle est désormais dépassée par les performances des nouvelles variétés.

PALMER (Advanta, DE-2010) est très régulier à ce niveau de potentiel. C'est une valeur sûre même si sa valeur alimentaire (UFL) le pénalise. La digestibilité de ses tiges et de ses feuilles est la plus faible de la série.

FUTURIXX (Ragt, 2010) est un grand hybride mixte qui répond également très bien pour du maïs grain. Sa valeur alimentaire est dans la moyenne.

Variétés en 3^{ème} année

EXXOTIKA (Ragt, 2012) Variété au potentiel dans la moyenne du regroupement mais assez précoce. Confirme.

DKC4117 (Dekalb, 2011) n'est pas la plus productive mais il est à la charnière de la série plus précoce. Elle le confirme une nouvelle fois cette année. Sa valeur UFL est plutôt bonne, grâce à une forte teneur en amidon dans la MS totale.

Variétés en 2^{ème} année

LG30311 (Limagrain, CZ-2012) moyen en potentiel mais précoce, cette variété est intéressante pour sa valeur alimentaire (UFL) et sa bonne qualité de tiges et feuilles. Attention de la verse a été observée.

SY PRESTIGIO (Syngenta, IT-2012) Grand hybride de fin de groupe, il vient compléter le panel de variétés hautement productives. Sa valeur alimentaire est malgré tout un peu faible.

Variétés en 1^{ère} année

RGT LUXXIDA (Ragt, 2014) hybride de milieu de groupe, il est intéressant pour son potentiel et sa régularité au sein des différents essais du réseau. Valeur UFL un peu faible.


SHANNON (Advanta, 2012), variété grain utilisable également en fourrage. UFL plutôt bon, tiré vers le haut par sa grande quantité d'amidon. Son potentiel est dans la moyenne inférieure des autres hybrides.

SY OCTAVIUS (Syngenta, IT-2014) propose un tonnage inférieur aux autres variétés dans les essais. Elle déçoit également par sa valeur UFL.


ON SE RESUME	Maïs grain ½ tardives (série SD)	Valeurs sûres	Variétés qui confirment	A essayer en 2015
	Précocité début de groupe		SY PRESTIGIO	
	Précocité milieu de groupe	PALMER		RGT LUXXIDA
	Précocité fin de groupe	FUTURIXX P0319	EXXOTICA	

Résultats 2015 de rendements et de précocité à la récolte

Rendement en t/ha



Etude de la valeur énergétique des variétés de maïs fourrage du groupe Demi-précoce à Demi-tardif (SD) Résultats 2015 de DMO non amidon et concentration en amidon



MAIS FOURRAGE : Caractérisez votre variété d'un seul coup d'œil
Centre-Ouest et Centre-Est**Variétés 1/2 Précoces à 1/2 Tardives (SD)**

Source des données : Réseau d'essais de Post-Inscription ARVALIS Institut du végétal, partenaires et UFS Section maïs

Carte d'identité

	Variété	Représentant	Année Inscription	Type grain	Productivité (%)			Précocité		Verse (%)	Qualité fourrage Toutes zones		
					2013	2014	2015	Floraison (écart moyen du regroupement)	% MS récolte (écart moyen du regroupement)		UFL (%)	Dinag (écart moyen du regroupement)	% Amidon dans la MS (%)
Témoins	SHEXXPIR	R.A.G.T. Semences	2009	cd.d	98.6	98.5	98.3	-0 j	-0.8 %	9.1	98.8	-1.6	99.8
	FUTURIXX	R.A.G.T. Semences	2010	d		102.8	102.2	+1 j	-1.3 %	6.9	99.5	-0.3	101.0
	PALMER	Advanta, Marque de Limagrain	DE-2010	d	104.3	105	102.9	+1 j	+0.1 %	5.5	98.2	-2.3	100.7
Rappel séries adjacentes	LG3264	LG, Marque de Limagrain	2007	c.cd	96.1	95	94.1	-4 j	+3.0 %	7.36	103.9	+2.4	100.0
	P0319	Pioneer Semences	AT-2010	d	103.5	104.7	101.5	+1 j	-2.5 %	2.8	99.5	-0.2	98.2
3ème année	DK04117	Semences Dekalb/Monsanto	2011	cd.d	98.3	97	99.3	-1 j	+1.3 %	1.8	102.6	+1.7	108.0
	EXXOTIKA	R.A.G.T. Semences	2012	cd.d	100.3	101.6	102.1	-1 j	+1.3 %	0.8	99.7	-0.6	102.3
2ème année	LG30311	LG, Marque de Limagrain	CZ-2012	c.cd		97.7	99.3	-3 j	+1.4 %	12.4	102.4	+2.7	99.4
	SY PRESTIGIO	Syngenta France SAS	IT-2012	d		103.4	102.6	+3 j	-2.0 %	5.1	97.9	-0.3	91.6
1ère année	RGT LUXXIDA	R.A.G.T. Semences	2014	cd.d			103.4	+0 j	-0.1 %	5.3	97.9	-1.7	94.5
	SHANNON	Advanta, Marque de Limagrain	2012	cd.d			99.1	+1 j	-0.2 %	2.9	100.8	+0.6	104.9
	SYOCTAVIUS	Syngenta France SAS	IT-2014	d			95.2	+1 j	-0.3 %	20	98.8	-0.3	99.6
Moyenne du regroupement					15.9 t/ha	100 % = 18.6 t/ha	17.2 t/ha	6 essais 11-jul	12 essais 33.1 % MS	6 essais 6.7%	100 % = 0.94	7 essais 50.3	100 % = 35.1 %

Verse	UFL
%	% de la moyenne des essais
0% ≤ X < 2.5%	X ≥ 104 %
2.5% ≤ X < 5%	101% ≤ X < 104%
5% ≤ X < 7.5%	99% ≤ X < 101%
7.5% ≤ X < 10%	96% ≤ X < 99%
10% ≤ X	X ≤ 96 %

Rendement
% de la moyenne des essais
X ≥ 104 %
101% ≤ X < 104%
99% ≤ X < 101%
96% ≤ X < 99%
X ≤ 96 %

Echelle de
notation :

++
+
+/-
-
--

2015	Retenus pour verse
41	ST LEONARD EN BEAUCE
44	VIELLEVIGNE
64	CASTETIS
68	RUSTENHART
79	VERNOUX EN GATINE
85	LUCON

2015	Retenus pour rendement et précocité
1	MISERIEUX
33	BOURDELLES
38	GILLONNAY
41	ST LEONARD EN BEAUCE
44	VIELLEVIGNE
49	ANDARD
64	CASTETIS
68	RUSTENHART
79	VERNOUX EN GATINE
85	LUCON
85	NALLIERS
85	ST PAUL MONT PENIT

Valoriser les maïs affectés par la sécheresse de l'été 2015

La sécheresse et les fortes températures de l'été 2015 subies dans de nombreuses régions d'élevage et notamment dans les régions de l'Est de la France ont eu des conséquences sur le rendement et sur la qualité des maïs fourrage. La question se pose maintenant de la valeur alimentaire de ces maïs fourrage. ARVALIS-Institut du végétal vous donne des repères pour une meilleure conservation et valorisation de ces maïs.

2015 : année chaude et très sèche dans l'Est

Pour un grand tiers nord-est de la France, depuis le Sud de la Picardie jusqu'à la région Rhône-Alpes en passant par le Centre et l'Auvergne, l'année climatique 2015 se caractérise par une période de fort déficit pluviométrique du 10 mai jusqu'à la fin août et par des températures élevées (> 30°C) dès la 2^e décennie de juin et ce jusqu'à la fin du mois d'août.


Habituellement, le maïs peut supporter des températures comprises en 30 et 35°C. Cependant, lorsque les besoins en eau ne sont pas satisfaits, ces températures deviennent pénalisantes pour les plantes qui se trouvent alors dans une situation critique.

Impact sur les plantes

Suivant l'intensité du stress hydrique et le stade du maïs, les effets sur les plantes ont pu être différents.

Ainsi, un déficit précoce avant floraison a limité le gabarit des plantes, un stress autour de la floraison a quant à lui limité la mise en place des épis, des ovules. Pendant la floraison, ce stress hydrique (accentué par les fortes chaleurs) a pu perturber la concordance d'émission de pollen et de la sortie des soies et réduire ainsi le nombre d'ovules fécondés. Par la suite, jusqu'au stade limite d'avortement des grains, ces conditions climatiques ont certainement causé la régression de ces futurs grains. En fin de cycle, les plantes ont réagi en fonction de leur état végétatif, notamment en fonction de l'importance de la surface foliaire verte. Le retour des pluies fin août a pu limiter les pertes en assurant un remplissage plus ou moins complet des grains présents, sous réserve de la présence de feuilles vertes pour assurer la photosynthèse.

Au sein d'une même région, il a existé une grande diversité de réactions des cultures, liée à la qualité de la préparation, à la structure du sol, à la présence d'un précédent (ray-grass détruit tardivement) et enfin à la date de semis. Pour ce dernier critère, les semis tardifs (courant mai) n'ont pas permis un enracinement suffisamment profond avant le stress hydrique et ont en général encore plus souffert de ces conditions climatiques.



Légende : Les analyses réalisées sur des maïs immatures en cours de dessèchement au cours de l'été 2015 (entre juillet et août) montrent que leur composition (peu d'amidon et beaucoup de sucres solubles) diffère d'un maïs classique habituellement situé dans la zone en pointillée du graphique, sans affecter leur valeur énergétique.

Une composition des maïs fourrage 2015 très variable

En fonction des conditions de végétation du maïs et du stade de récolte, la composition chimique des maïs 2015 est assez différente du maïs fourrage « standard ». En effet, dans les situations les plus critiques, les premiers maïs ont été ensilés dès la première décade d'août : il s'agissait le plus souvent de plantes relativement courtes (1.30 m à 1.50 m), desséchées (60 à 70% des feuilles desséchées), avec peu voire pas de grains et de surcroît un remplissage inachevé. La teneur en amidon de ces maïs est donc très faible avec pour un grand nombre d'entre eux des valeurs inférieures à 15%. A l'inverse pour des maïs récoltés plus tardivement (début

Des valeurs alimentaires hétérogènes mais malgré tout assez bonnes

Les maïs de la zone Est, les plus touchés par la sécheresse et les fortes températures, se caractérisent tout d'abord par une forte variabilité de leur teneur en MS avec comme conséquence des ensilages humides qui ont « coulé » ou à l'inverse des ensilages secs très difficiles à tasser

La digestibilité enzymatique de l'appareil végétatif (dMOna) est en général élevée : le stress hydrique est intervenu à un stade précoce (autour de la floraison) sur des plantes jeunes dont les tissus étaient peu lignifiés. Ainsi, malgré une teneur en amidon en retrait, la bonne digestibilité des tiges + feuilles permet aux maïs 2015 d'afficher une très bonne valeur énergétique (0.93 UFL en moyenne) masquant cependant une forte variabilité.

Valoriser les maïs 2015 dans les rations lait et viande

Pour élaborer des rations tant en production laitière qu'en production de viande, on peut regrouper les maïs 2015 en 3 classes en fonction de la digestibilité des tiges et feuilles et de leur teneur en amidon.

- Les maïs, avec une bonne valeur énergétique, des fibres très digestibles mais une teneur assez faible en amidon devront être complétés avec des concentrés riches en amidon (céréales) et des fourrages fibreux (foin, paille)

- Les maïs, avec une bonne valeur énergétique, une teneur en amidon élevé mais des fibres assez peu digestibles nécessiteront l'ajout de fourrage fibreux très digestibles et des concentrés peu riches en amidon

- Enfin, les maïs avec une faible valeur énergétique liée soit à un déficit en amidon, soit à un faible niveau de

septembre) avec un nombre de grains corrects et un bon niveau de remplissage, les teneurs en amidon dépassent les 25%.

La teneur en sucres solubles est également très variable selon l'état de l'appareil végétatif et la présence ou non de grains. Elle est en moyenne plus élevée que les années précédentes. En effet, l'absence de grains ou l'arrêt du transfert des sucres solubles vers les grains liés au stress hydrique a conduit à un stockage de ces sucres dans la plante pouvant conduire à des teneurs en glucides solubles de 15 à 20% de la MS pour des teneurs en amidon inférieurs à 10%.

Ces maïs se caractérisent également par une teneur en MAT plus élevée qu'en 2014 liée essentiellement à un faible taux de dilution de l'azote dans la plante et à des fertilisations azotées adaptées à des niveaux de rendement de 20 à 50% plus élevés. Les valeurs azotées PDIN et PDIE des maïs sont élevées avec parfois + 10 à +20g/kg MS de PDIN et +5g/kg MS de PDIE par rapport à 2014.

Cette année, plus que jamais, l'analyse de fourrage reste incontournable et permettra de situer plus précisément les valeurs énergétiques et azotées de ces maïs afin d'adapter les rations à leurs caractéristiques.

digestibilité des tiges et feuilles seront complétés avec des céréales pour des teneurs faibles en amidon (inférieur à 25%). Sinon, ils seront complétés par des pulpes ou des coproduits. Dans tous les cas, ces maïs sont à réserver en priorité aux animaux à faible besoin.

Pour rappel, il est essentiel de ne pas dépasser le seuil des 22-23% d'amidon dans la ration des vaches laitières. Cela est d'autant plus vrai cette année que les teneurs en glucides solubles, qui sont rapidement fermentescibles dans le rumen, sont élevées.

Dernier point : au vu des analyses, pour ces maïs qui sont riches en PDIN (fortes teneurs en MAT), il sera possible de diminuer nettement les quantités de correcteur azoté.

Attention à la conservation et aux stocks !

Compte-tenu des fortes teneurs en glucides solubles à la récolte, ceux-ci ne seront pas totalement consommés lors de la phase d'acidification. Ce substrat pourra alors permettre un développement non désiré de levures et de moisissures si le front d'attaque n'avance pas assez vite et/ou si les températures sont élevées. De plus, dans le cas de maïs avec peu d'amidon et une part de feuilles sèches importantes, le tassement a souvent été moins efficace que les années précédentes. On peut craindre une moindre densité des silos et donc plus d'air dans la

masse du fourrage. La stabilité à l'ouverture sera donc moins bonne que d'habitude.

Enfin, attention aux stocks ! Les densités du maïs au silo sont plus faibles que d'habitude. Il convient donc de bien évaluer les tonnes de MS d'ensilage de maïs stockées et d'anticiper rapidement par des achats (fourrage, coproduits) si besoin pour éviter une rupture de stock. L'ajout d'un fourrage complémentaire à la ration est vivement conseillé cet hiver pour permettre de réduire la consommation de maïs.

FUSARIOSE DE L'EPI

Fusariose sur épis

SYNTHESE PLURIANNUELLE DES NOTATIONS DE FUSARIUM GRAMINEARUM

Au-delà des effets sur le rendement, les fusarioses sur épis produisent des fusariotoxines, des DON et la zéaralénone pour ce qui concerne *Fusarium graminearum*, et des fumonisines pour les fusarioses de la famille des *liseola*. Ces mycotoxines de champ font l'objet de réglementation avec des valeurs seuils maximales à ne pas dépasser pour l'alimentation humaine et des recommandations pour l'alimentation animale. Les parcelles très touchées posent de ce fait des problèmes de débouchés qu'il convient de minimiser.

La variabilité inter-annuelle des symptômes de fusariose des épis et des teneurs en fusariotoxines confirme le poids prépondérant du climat : pluviosité au moment de la floraison femelle et dans les jours qui suivent, hygrométrie et niveaux de température après la floraison et au cours de l'automne, et durée d'exposition à la progression des pathogènes.

Les facteurs de risque prépondérants de développement de *Fusarium graminearum* sont par ordre d'importance décroissante, au-delà de l'effet climatique qui ne peut être maîtrisé, le retard de maturité qui génère des dates de récolte tardives, la sensibilité des variétés et enfin la gestion des résidus des précédents culturaux (broyage et enfouissement). Les symptômes *F. liseola*, producteur de fumonisines, sont, en plus et quant à eux, soumis des

interactions avec des primo infections par d'autres pathogènes (dont *F. graminearum*), des dégâts de foreurs (pyrales, sésamie, héliothis) et des à-coups de croissance des grains. L'effet génétique de résistance aux fusarioses *Liseola* est de ce fait impossible à caractériser avec bonne répétabilité.

Recommandations

L'accumulation des facteurs de risque crée un effet amplificateur. Ces interactions obligent à mobiliser simultanément plusieurs leviers techniques :

- des dates de semis et de récolte du maïs optimales et un choix de précocité de variété approprié (les semis très tardifs, retards de maturité et récoltes au-delà du 1^{er} novembre exposent plus longtemps les parcelles, infectées durant la période de floraison, aux développements des pathogènes) ;
- le choix de variétés appropriées en précocité et, en situations de risque, pas trop sensibles à *F.graminearum* ;
- la minimisation de l'inoculum par une gestion des résidus de récolte du maïs et un travail du sol qui accélèrent la décomposition des résidus (broyage, enfouissement),
- une protection appropriée aux risques de foreurs.

ACTUALISATION DES REFERENCES SUR LES VARIETES

Le choix des variétés participe à la réduction des risques de fusariotoxines en situations de potentiel infectieux (climat, itinéraire technique).

Des différences entre variétés

Il a été montré qu'il existe des différences d'expression de symptômes entre variétés, à *f. graminearum*. Les différences s'expriment plus ou moins selon les niveaux d'infection et les concordances entre les dates de floraison et les contaminations.

Méthode et notations

Les notations au champ reposent sur des dénombrements d'épis présentant 2% de grains pourris ou touchés par des développements de *f. graminearum*.

Les essais retenus

Les synthèses des notations réalisées depuis 2008 proviennent de différents types d'essais :

- essais variétés du réseau de Post-Inscription réalisés par ARVALIS et ses partenaires, dont UFS Section maïs,
- essais spécifiques réalisés par ARVALIS en parcelles à risques fréquents,
- essais des années 2012 et 2014 du réseau CTPS piloté par le GEVES.

Seuls les essais aptes à exprimer des différences entre variétés, c'est-à-dire suffisamment atteints, sont retenus dans les synthèses. Sont vérifiés aussi que les observations ont été réalisées sur un nombre d'épis minimal, présentent une bonne précision et n'ont pas subi d'interactions importantes avec d'autres pathogènes et de forts dégâts de foreurs.

TRAITEMENT STATISTIQUE DES DONNEES ET PRESENTATION DES RESULTATS

Les résultats moyens de pourcentages d'épis touchés par variété (et leur intervalle de confiance au risque 20 %) reposent sur des observations issues d'un minimum d'essais valides par variété et groupe de précocité. Les analyses statistiques sont réalisées avec un modèle approprié aux séries incomplètes, la procédure mixed de R qui permet d'estimer les effets variétaux (facteur fixe) et en tenant compte de l'effet essais (facteur aléatoire). Comme les listes de variétés sont glissantes entre années (matrice incomplète) sur les séries historiques d'essais analysés par groupe-liste de précocité, des règles d'introduction dans les ajustements ont été appliquées, à savoir au moins 3 essais valables par variété. Les pourcentages d'épis dénombrés dans les

essais sont transformés en « arc sinus racine carrée » pour normaliser les distributions. Les moyennes ajustées des % d'épis atteints par f. graminearum, ainsi que leurs intervalles de confiance (seuil alpha de 20%), sont ensuite exprimées dans l'échelle de notation initiale. Les moyennes de % épis atteints par f. graminearum par variété, qui figurent dans les tableaux ci-après, estimées par liste de groupe de précocité, ont été réindexées sur un pourcentage moyen par groupe de précocité de 5% (« Moyenne ramenée à 5% d'épis touchés »). Cette moyenne correspond à des dégâts moyens significatifs. Toutefois cette sorte de normalisation d'échelle ne permet pas d'effectuer de comparaisons entre groupes de précocité qui sont analysés indépendamment.

Tableaux 1, 2, 3, 4, 5 et 6: Comportement au *fusarium graminearum* des variétés de 6 groupes de précocité
Moyennes de % épis présentant au moins 2 % de grains touchés et intervalles de confiance calculés sur les essais retenus au seuil 20%. Figurent derrière les noms des variétés, les nombres d'essais retenus dans les synthèses.

Très Précoces				
Variétés	nb essais 2008-2015	% d'épis touchés		
		Moyenne estimée	Intervalle de confiance	
			Valeur minimale	Valeur maximale
AJAXX	6	2.1	0.0	8.8
AMBROSINI	4	4.8	0.3	14.7
BENETTO	3	2.4	0.0	11.3
COXXIMO	4	12.0	3.3	25.3
DKC2931	3	8.3	1.2	21.2
DS0442A	3	0.9	0.0	7.6
ES TECHNO	3	1.3	0.0	8.7
EXXPRIM	3	2.4	0.0	11.3
KANEVAS	3	5.7	0.3	17.1
KIPARIS	3	10.6	2.2	24.6
KOLORIS	3	4.6	0.1	15.3
KONSENSUS	7	9.7	2.8	20.5
KWINNS	3	3.7	0.0	13.8
MAS 17E	3	9.2	1.6	22.5
MAS 17G	3	0.3	0.0	5.6
NK FALKONE	7	2.3	0.0	8.9
PLENTY	3	0.0	0.0	1.7
REBBEL	3	10.2	2.0	24.0
SPHINXX	7	3.3	0.1	10.8
STEFIXX	3	2.5	0.0	11.5
STORM	6	5.1	0.6	14.1
TIBERIO	3	8.5	1.3	21.5
Moyenne ramenée à 5% d'épis touchés		5.0		
min		0.0		
Max		12.0		
Sources des essais : Réseau Post-Inscription ARVALIS (4 essais), Réseau CTPS-GEVES (3 essais)				

Sources des essais : Réseau Post-Inscription ARVALIS (10 essais), réseau CTPS-GEVES (1 essai)

Précoces				
Variétés	nb essais 2008-2015	% d'épis touchés		
		Moyenne estimée	Intervalle de confiance	
			Valeur minimale	Valeur maximale
ADEVEY	6	2.9	0.5	7.2
AMELIOR	5	2.0	0.1	6.0
ANJOU 277	5	10.0	4.8	16.3
DKC3398	6	4.0	1.1	8.6
DKC3409	5	3.6	0.7	8.4
DKC3730	4	2.7	0.2	7.6
DKC4250	5	0.9	0.0	3.9
DS0493B	4	5.3	1.3	11.3
ES COCKPIT	3	2.5	0.1	8.0
ES TOLERANCE	4	0.6	0.0	3.8
KANDIS	8	9.4	5.0	14.5
KASIMENS	4	7.5	2.6	14.1
KATARI CS	4	0.9	0.0	4.4
KLAMAS	4	2.0	0.1	6.5
KOHERENS	11	7.1	3.6	11.4
KOMPROMIS	5	8.0	3.4	14.0
KONKORDANS	5	4.3	1.0	9.4
KOUTELAS	4	4.1	0.8	9.5
KREOLIS	4	6.1	1.8	12.3
KROISSANS	4	9.1	3.7	16.0
LG3240	4	3.2	0.4	8.2
LG3258	7	10.3	5.6	15.8
LINDSEY	4	5.7	1.5	11.8
LUIGI CS	4	1.6	0.0	5.7
MAS 21D	11	6.0	2.8	10.1
MAS 29T	4	1.5	0.0	5.7
MERCURIO	5	5.8	1.9	11.3
MILLESIM	7	10.9	6.0	16.6
RIVALDINIO KWS	3	8.4	2.7	15.9
RONALDINIO	10	7.6	3.9	12.2
SANTURIO	5	5.3	1.6	10.6
SEBASTO	5	4.3	1.1	9.3
TENESSY	4	3.6	0.5	9.0
TRIOMPH	5	2.6	0.3	6.9
Moyenne ramenée à 5% d'épis touchés		5.0		
min		0.6		
Max		10.9		

Demi-Précoces C1				
Variétés	nb essais 2008-2015	% d'épis touchés		
		Moyenne estimée	Intervalle de confiance	
			Valeur minimale	Valeur maximale
ARDENNO	3	2.2	0.1	6.5
CLEMENSO	3	0.2	0.0	2.3
CODILIO	5	2.5	0.4	6.1
CRAZI	3	2.9	0.3	7.8
DK315	10	3.8	1.4	7.1
DKC3871	3	2.9	0.3	7.9
DKC3890	7	4.1	1.5	7.8
DKC3930	6	3.6	1.1	7.4
DKC3931	6	4.2	1.4	8.2
DKC3938	3	6.5	2.2	12.2
DKC4012	3	9.8	4.6	15.9
DKC4102	8	3.8	1.3	7.3
DKC4117	11	7.7	4.3	11.6
DKC4141	3	7.4	2.8	13.3
DKC4190	3	0.8	0.0	4.0
DKC4197	12	6.9	3.7	10.6
DODIXX	3	1.7	0.0	5.6
ES CUBUS	12	3.4	1.2	6.4
ES GALLERY	5	6.0	2.4	10.6
ES GARANT	3	0.6	0.0	3.5
EXXCLUSIV	8	1.4	0.1	3.9
FISIXX	3	7.9	3.2	13.8
JOLIET	3	2.3	0.2	6.6
KARAMELIS	3	8.9	3.9	15.1
KAUSTRIAS	3	0.2	0.0	2.3
KLEONARS	3	6.8	2.5	12.6
KLOUIS	6	13.6	8.8	18.5
KONFERENS	5	3.8	1.1	8.0
KONKRETIS	3	7.8	3.1	13.7
KWS 9361	12	7.1	3.9	10.9
LBS3403	3	1.5	0.0	5.3
LG3258	3	12.1	6.4	18.4
MAS 31R	3	0.4	0.0	3.2
MATRIXO	3	4.0	0.7	9.3
NK COBALT	3	1.3	0.0	4.9
OSCARRO	5	8.7	4.4	13.8
P8816	5	2.5	0.4	6.1
P9203	6	7.0	3.3	11.5
P9213	5	2.9	0.6	6.7
P9400	6	5.3	2.1	9.6
PORTORICO	3	13.8	7.8	20.0
PR38H20	6	5.6	2.3	10.0
PR38N86	9	2.0	0.4	4.7
PRIVILEGE	6	7.6	3.8	12.3
RGT CONEXION	5	3.1	0.7	7.0
RGT DUBLIXX	3	3.2	0.5	7.9
RGT PROVEXX	5	9.0	4.7	14.1
RGT XXAVI	3	0.8	0.0	4.0
SY TALLINN	5	6.8	3.0	11.6
TROCADERO	3	11.4	5.8	17.6
Moyenne ramenée à 5% d'épis touchés		5.0		
min		0.2		
Max		13.8		
Sources des essais : Réseau Post-Inscription ARVALIS (13 essais), Réseau CTPS-GEVES (3 essais)				

Demi Précoces C2				
Variétés	nb essais 2008-2015	% d'épis touchés		
		Moyenne estimée	Intervalle de confiance	
			Valeur minimale	Valeur maximale
DKC4408	13	5.6	3.1	8.7
DKC4522	16	2.4	0.9	4.5
DKC4530	6	5.2	2.1	9.2
DKC4541	5	11.1	6.4	16.4
DKC4590	18	3.2	1.5	5.5
DS0610C	4	2.3	0.3	6.0
DS1071C	6	10.0	5.7	14.9
ES FLATO	18	8.1	5.3	11.2
FERARIXX	16	2.9	1.2	5.2
KAMPONI CS	3	5.3	1.5	10.9
KASSANDRAS	13	2.4	0.9	4.8
KOMPARES	3	10.5	5.0	17.2
KONFESS	8	3.8	1.5	7.0
MARTELI	8	2.5	0.7	5.3
MAS 33A	7	0.4	0.0	2.1
MAS 37V	14	1.5	0.4	3.4
OBIXX	20	2.7	1.2	4.7
ORGANDI CS	9	3.6	1.5	6.6
P9578	13	5.3	2.9	8.4
PR37Y12	8	7.9	4.4	12.0
PR38A79	8	1.5	0.2	4.0
PR38T76	8	6.4	3.2	10.4
RGT PREFIXX	3	8.7	3.6	15.1
SHEXXPIR	13	8.0	5.0	11.4
SY DARTONA	3	9.3	4.0	15.8
SY IZOAR	3	2.6	0.3	7.2
VENITIO	6	2.1	0.4	5.0
Moyenne ramenée à 5% d'épis touchés		5.0		
min		0.4		
Max		11.1		
Sources des essais : Réseau Post-Inscription ARVALIS (24 essais), Réseau CTPS-GEVES (2 essais)				

Demi Tardives					Tardives et Très Tardives				
Variétés	nb essais 2008-2015	% d'épis touchés			Variétés	nb essais 2008-2015	% d'épis touchés		
		Moyenne estimée	Intervalle de confiance				Moyenne estimée	Intervalle de confiance	
			Valeur minimale	Valeur maximale				Valeur minimale	Valeur maximale
BALASCO	5	1.6	0.2	4.6	AACIENDA	5	2.6	0.4	6.5
CITIXXO	6	5.0	2.1	8.9	AAPOTHEOZ	11	4.7	2.0	8.3
COURTNEY	8	1.6	0.3	4.0	ANADON	4	4.6	1.2	9.8
DA SCIPIO	3	2.2	0.1	6.5	CORETTA	8	9.4	5.3	14.5
DEVOLVI CS	3	5.2	1.4	10.8	DKC5190	12	2.6	0.7	5.4
DKC4608	7	9.9	6.0	14.5	DKC5222	10	5.7	2.7	9.8
DKC4621	10	2.9	1.1	5.5	DKC5401	4	2.9	0.4	7.3
DKC4795	19	5.5	3.4	8.1	DKC5632	4	6.3	2.2	12.2
DKC4814	18	9.1	6.3	12.2	DKC5717	3	11.9	5.6	19.8
DKC4990	9	3.4	1.4	6.3	DKC5783	19	6.2	3.4	9.7
DKC4995	7	4.3	1.8	7.8	DKC5830	4	8.3	3.5	14.6
DKC5031	10	6.8	3.9	10.5	ES ANTALYA	16	5.9	3.1	9.5
DS0747D	10	5.3	2.8	8.6	ES ARCHIPEL	12	2.0	0.5	4.6
FUTURIXX	11	4.4	2.2	7.3	LG30597	5	7.1	3.0	12.6
KIMBERLEY	6	2.8	0.7	6.0	LG3490	12	1.8	0.4	4.3
LABELI CS	3	4.0	0.8	9.2	MAGGI CS	4	2.0	0.1	6.0
LG30491	14	2.1	0.7	4.1	MAS 51G	5	3.8	1.0	8.3
LOUBAZI CS	4	1.8	0.1	5.2	MAS 52C	5	5.3	1.8	10.3
MAMILLA	5	5.4	2.1	10.1	MAS 53B	4	3.5	0.7	8.3
MAS 40F	7	6.9	3.5	11.1	MAS 58M	4	4.3	1.1	9.4
MAS 51G	8	7.9	4.5	12.1	ONEXX	4	4.0	0.9	9.0
MEMOXX	7	4.5	1.9	8.1	P0222	9	6.7	3.3	11.2
MILANNO	7	7.5	4.1	11.8	P0725	10	3.0	0.9	6.1
P9838	9	6.7	3.7	10.5	P0837	5	2.0	0.2	5.6
P9900	7	9.1	5.2	13.7	PR33A46	7	8.8	4.6	14.1
PARADISIO	7	6.9	3.6	11.0	PR33Y74	6	4.5	1.5	8.9
PHILEAXX	5	5.1	1.9	9.4	PR34N61	4	3.7	0.8	8.5
PINCKI CS	9	3.2	1.2	6.1	PR34N84	3	7.4	2.5	14.3
PIXXTOL	14	5.3	3.0	8.2	PR34P88	6	9.2	4.7	14.7
PR36D79	6	11.9	7.2	17.3	PR35A52	3	7.4	2.6	14.3
PR37F73	9	4.0	1.7	7.1	PR35F38	3	0.9	0.0	4.5
PR38A24	13	7.6	4.8	11.0	PR36K67	8	2.5	0.5	5.7
PR38V52	5	2.7	0.5	6.3	ZOOM	8	4.1	1.4	7.9
REALI CS	6	6.4	3.0	10.9	Moyenne ramenée à 5% d'épis touchés		5.0		
RGT EXPLICIT	7	4.3	1.7	7.9	min		0.9		
RGT LEXXTOUR	7	2.4	0.6	5.3	Max		11.9		
SHANNON	6	3.3	1.0	6.7	Sources des essais : Réseau Post-Inscription ARVALIS (18 essais), Réseau CTPS-GEVES (1 essai)				
STAMENCO	7	2.2	0.5	5.0					
STILIXX	4	3.7	1.0	8.1					
Moyenne ramenée à 5% d'épis touchés		5.0							
min		1.6							
Max		11.9							
Sources des essais : Réseau Post-Inscription ARVALIS (25 essais), Réseau CTPS-GEVES (2 essais)									

DESHERBAGE

Lutte contre les mauvaises herbes

DESHERBAGE 2015 : AVANTAGE AUX RACINAIRES

Les conditions météorologiques du printemps 2015 avec des pluies régulières, sur le mois d'avril et sur la première décade de mai ont été favorables aux applications de pré-levée et post-levée précoce qui utilisent principalement des produits à action racinaire. Les traitements de post classique avec les produits majoritairement foliaires ont été difficiles à positionner compte tenu des conditions hygrométriques peu favorables qui ont régné durant le mois de mai. Du point de vue de la flore, les graminées ont été très présentes mais ont été en général bien contenues avec les applications de prélevée. La flore a été riche

en dicots classiques telles que le chénopode avec parfois des densités de plantes très élevées. Les conditions météorologiques peu favorables à l'expression des traitements de post-levée ont parfois conduit à des résultats insatisfaisants dans la lutte contre ce type d'adventices (chénopodes, mercuriales...) et de nombreux rattrapages ont dû être réalisés. Dans cette ambiance, les solutions de désherbage mécaniques ont offert un bon complément avec une météo plutôt favorable pour ce mode de lutte contre les adventices.

COMPLÉMENTS D'INFORMATION SUR LES PRODUITS

Produit de pré-levée

Ø CALLIPRIME-XTRA/LUMESTRA 480

Composition	Mésotrione 480 g/l
Formulation	SC
Dose AMM / ha	0.33 l
Usages	Maïs grain et fourrage, maïs semence, maïs doux
Période d'application	Pré-levée à post-levée précoce
Doses recommandées	Pré-levée : 0.2 à 0.33 l/ha associé Post – levée précoce : 0.2 à 0.33 l/ha seul ou associé
Classement et phrases de risque	H317, H400, H410
Délai avant récolte (DAR)	BBCH 14 Grain/Fourrage/42 j (dx)
Délai de rentrée (DRE)	48 heures
Zone non traitée aquatique	DVP 20 m
Zone Non Traitée (ZNC adjacente)	20 mètres


Avis ARVALIS

La mésotrione, molécule utilisée depuis longtemps en traitement de post-levée est ici déclinée en traitement de pré-levée. Homologué à 0.33 l/ha, ce produit apporte 158 g de mésotrione soit l'équivalent de 1.5 l de Callisto. Le produit est en attente d'une homologation sur sorgho à la dose d'AMM de 0.2 l.

Avec son spectre antidycoylédones et son activité antigraminées, il pourra constituer un complément à un produit contenant un chloroacétamide (Isard, Dual gold...) en application de prélevée.

■ Spectre des efficacités du Calliprime Xtra/Lumestra 480 dans les essais Arvalis

(La ligne rouge indique la moyenne des notes. L'aire verte indique la plage de résultats. Entre parenthèse, le nombre de résultats)



Produit de post-levée

Ø Souverain OD/Ducanti OD

Composition	Sulcotrione 150 g/l + nicosulfuron 20 g/l
Formulation	OD
Dose AMM / ha	2 l
Usages	Maïs grain et fourrage.
Période d'application	Post-levée
Doses recommandées	Post – levée : 1.5 l/ha seul ou associé
Classement et phrases de risque	H361d/H373/H400/H410
Délai avant récolte (DAR)	BBCH 19 Grain/Fourrage
Délai de rentrée (DRE)	6 heures
Zone non traitée aquatique	DVP 20 m
Zone Non Traitée (ZNC adjacente)	5 mètres


Avis ARVALIS

Cette association de sulcotrione et de nicosulfuron est une proposition d'herbicide systémique de post-levée à large spectre du même registre qu'Elumis. Elle correspond au mélange historique Mikado + Milagro mais sous la formulation OD. L'activité antidicotylédones est correcte bien qu'un peu juste sur renouée liseron et


renouée des oiseaux. Son atout significatif par rapport à l'Elumis est son efficacité sur amброisie à feuille d'armoise (le plus de la sulcotrione). L'activité antigraminées ne pourra constituer qu'un complément à une application spécifique de prélevée avec un chloroacétamide.

■ Spectre des efficacités du SouverainOD/Ducanti OD dans les essais Arvalis

(La ligne rouge indique la moyenne des notes. L'aire verte indique la plage de résultats. Entre parenthèse, le nombre de résultats)



■ Efficacité comparée SouverainOD/Elumis dans les essais Arvalis



RESEAU DESHERBAGE REGION EST


Trois essais de comparaison de stratégies de traitements ont été suivis dans l'Est en 2015. Les nouvelles solutions herbicides homologuées (Calliprime, Souverain OD) et d'autres encore sous numéro ont été comparées à des références pour chaque stratégie de traitement.

Les lieux et les infestations sont :



Adventices / m2	Uffholtz (68)	Choezeau (38)	Chabeuil (26)
Chenopode blanc	20	24	8
Chenopode hybride / polysperme	20	10	
Panic pied de coq	52	13	
Morelle noire	23	55	
Renouée liseron	27		
Renouée persicaire	20		
Mouron des oiseaux	17		
Sétaire glauque et verte		36	89
Digitaire sanguine		55	
Ambroisie			3

Résultats essais réseau Est 2015 – Calliprime en pré-levée et en post levée. Souverain OD en post-levée.

Note globale sur l'ensemble de la flore présente (graminées + dicotylédones)



Note globale sur les graminées



Echelle de notation d'efficacité (par adventice ou pour l'efficacité globale)

% d'efficacité	Note	Description
0 à 4 %	0	0 % de destruction.
> 4 à 10 %	1	< 10 % de réduction, mais les herbes sont plus petites que dans le témoin.
> 10 à 20 %	2	10 à 30 % de destruction ou taille réduite.
> 20 à 30 %	3	
> 30 à 40 %	4	30 à 40 % de destruction ou taille réduite de 2 à 4 cm.
> 40 à 85 %	5	40 à 85 % de destruction ou taille réduite (ou les deux).
> 85 à 95 %	6	85 à 95 % de destruction - il reste des plantes de toutes les tailles. Aurait nécessité un rattrapage.
> 95 à 97 %	7	Désherbage acceptable. 95 à 97 % de destruction selon la densité du témoin. Il reste 2% des plantes ou des repousses.
> 97 à 98 %	8	Très satisfaisant. Il reste 1 ou 2 adventices visibles et quelques plantules.
> 98 à 99 %	9	Presque parfaits. Il reste 1 ou 2 adventices visibles.
> 99-100 %	10	Parfait. Il ne reste aucune adventice visible sur la parcelle.

Quelques commentaires

La présence de graminées démontre encore la nécessité d'intervenir avec un produit racinaire, soit en prélevée, soit en post-levée précoce. Cette dernière stratégie a été moins sécuritaire dans le réseau d'essais en 2015. Le mélange Isard + Adengo est efficace en prélevée. C'est aussi le cas de la stratégie Dual en pré suivi d'Elumis + Peak en post-levée ou dans une moindre mesure de Monsoon Active + Auxo. Le spectre de ces différents programmes est correct. L'essai d'Uffholtz montre toutefois une difficulté dans la lutte contre la renouée liseron. Cette adventice doit être régulée avec des produits de type sulfonylurée anticots ou éventuellement par du bromoxynil.

Les produits nouveaux

Calliprime Xtra ou Lumestra 480 : associé à Isard en prélevée, il montre une efficacité moyenne en retrait par rapport à l'association Isard/Adengo sur l'ensemble de la flore composée de graminées et dicotylédones. Associé à Dual Gold en post-levée précoce le niveau d'efficacité reste le même sauf pour les graminées, plus particulièrement sur le site de Chabeuil(26) où la présence de sétaire glauque n'a pu être contrôlée par cette association.

Souverain OD ou Ducanti OD : comme le montre les figures ci-dessus, l'efficacité de cette spécialité sur graminées est un peu juste et n'atteint pas le niveau de satisfaction requis. En revanche, pour la lutte antidicotylédones, ce produit a donné de bons résultats sur les 3 trois lieux sur lesquels il a été testé avec une prime pour la lutte contre l'ambrosie.

Les produits à venir :

BCP 253H (clomazone + pendiméthaline) semble apporter une efficacité intéressante sur graminées en association avec l'Isard. Il est par contre faible sur les dicots dans le réseau d'essais. Le BCP 258H (pyridate) a été testé en association avec du Biathlon. Le programme devra être affiné pour présenter un intérêt, en particulier sur dicots. Le produit Q9H36 (nicosulfuron, rimsulfuron et mésotrione) appliqué seul (avec un adjuvant tout de même) en deux fois, présente un spectre intéressant mais il faudra certainement envisager un produit associé ou une intervention préalable (en prélevée par exemple) pour désherber au mieux.

Le point réglementaire sur les mélanges et les DRE

La mise en place du classement des spécialités sous format CLP (1^{er} juillet 2015) a entraîné certaines modifications de possibilités de mélanges entre spécialités. Cette mention de danger n'est pas induite par de nouvelles études toxicologiques mais par la différence des seuils de concentration pris en compte entre le classement DPD et CLP.

Impact du classement CLP sur les mélanges herbicides

	MonsoonActive	Adengo, MerlinFlexx	Auxo, Cadeli, Decano, Diode, Emblem, EmblemFlo, LaudisWG, Rajah, SouverainOD, StratosUltra, WeedazolTL	Tous les autres herbicides
MonsoonActive				
Adengo, MerlinFlexx				
Auxo, Cadeli, Decano, Diode, Emblem, EmblemFlo, LaudisWG, Rajah, SouverainOD, StratosUltra, WeedazolTL				
Tous les autres herbicides				

Ces herbicides ne peuvent pas se mélanger entre eux mais peuvent se mélanger avec tous les autres herbicides (d'un point de vue réglementaire) : Adengo, Auxo, Cadeli, Decano, Diode, Emblem, EmblemFlo,

LaudisWG, MerlinFlexx, Rajah, SouverainOD, StratosUltra, WeedazolTL
MonsoonActive ne peut pas se mélanger avec Adengo ou MerlinFlexx

Impact du classement CLP sur les délais de rentrée dans les parcelles

	48 heures	24 heures	6 heures
H317, H344	Atic aqua, Auxo, Basagran SG, Benta 480, Cambio, Camix, Dakota P, Decano, Dual GS, Emblem flo, Isard, Juan, Kart, Mercantor G, Nicit, Pampa 6OD, Rajah, Ritmic, Starane200, U46D, Calliprime-Xtra		
H315, H318, H319		Cadeli, Cadence, Callisto, Chardol 600, Conquérant, Monsoon Active, Stratos ultra, Mesostar	
Autres mentions de danger H			Accent WG, Adendo, Biathlon, Casper, Diode, Elumis, Emblem, Harass, Laudis WG, Lontrel 100, Lontrel SG, Merlin Flexx, Nicozea, Oceal, Pampa, Peak, Primero, Prowl 400, Souverain OD, Tarot, Weedazol

LES STRATEGIES DESHERBAGE DU MAÏS

EXEMPLE DE PROGRAMMES (LISTE NON EXHAUSTIVE) « PRIX INDICATIFS »

Prendre en compte la flore attendue et le temps disponible

Pour choisir à priori la stratégie de désherbage à mettre en œuvre, la première question à se poser est le type de flore susceptible d'être présente sur la parcelle. La seconde est d'estimer le créneau disponible pour désherber (une ou plusieurs applications) en fonction


des autres travaux de l'exploitation (atelier animal, cultures spéciales gourmandes en main d'œuvre...) En fonction de ces critères, on s'orientera vers du tout en prélevée, du pré puis post ou du tout en post.

Classification de la flore adventice

Graminées	Dicots classiques	Dicots difficiles	Vivaces	Les principales adventices du maïs dans la région
X				Panics, Sétaires, Digitaires, Ray-grass
	X			Chénopode, Amarante, Morelle, Renouée persicaire
		X		Mercuriale, Renouée liseron, Ambrosie, Renouée des oiseaux, Géraniacées, Linaires, ...
			X	Liserons, Ronce, Chardon, Rumex, Ortie...

Les stratégies conseillées en fonction de la flore présente

Cas Type	Graminées	Dicots classiques	Dicots difficiles	Vivaces	Stratégies conseillées
1	OO	XX			Prélevée renforcée
2	OO	XX	XX		Prélevée simple puis Post
3'	X	XX	X		Post levée précoce 1 passage
3''	X	XX	XX		Post levée 2 passages
3'''		XX	X		Post levée 1 passage
4	X ou OO	X ou XX	X ou XX	X ou XX	Prélevée puis Post levée avec intervention vivaces



Premier critère vis-à-vis de la flore : la pression en graminées

Les graminées sont (à l'exception du cas particulier des vivaces), les adventices qui posent le plus de problème lorsque leur densité est très forte mais surtout lorsque leur stade est avancé. Si la pression en graminées de la parcelle est élevée, il faut absolument intervenir en prélevée dédits graminées qui correspond souvent à la prélevée du maïs. Pour cela, on utilisera des herbicides

à action racinaire. Plusieurs conditions sont à réunir pour le succès d'un tel désherbage :

- Le sol doit être frais, bien rappuyé, sans trop de mottes
- 1 à 15 mm de pluie sont nécessaires dans les 10 jours qui suivent l'application

Privilégier les interventions sitôt le semis ou du moins dans les 48 heures pour profiter du léger travail du sol

Deuxième critère : le type de dicotylédones

Si la population de graminées est importante et que l'on décide d'intervenir en prélevée, il peut être judicieux de tout « faire d'un coup », c'est-à-dire d'éliminer également les dicotylédones. C'est possible si celles-ci sont considérées comme « classiques », c'est moins évident si elles sont classées comme « difficiles ». Dans le premier cas, on associe un antidicot de prélevée à l'antigraminées, dans le second, on réintervient en post-levée avec un antidicot de post-levée à action foliaire type bromoxynil, ou avec un produit à action foliaire et racinaire comme les suffonylurée anti-dicts (prosulfuron, tritosulfuron)

A Tout en pré-levée

A Tout en pré-lévée

30 €	Dual Gold / Aliseo 1,4 à 1,6	+	32 €	Merlin Flexx 1,7	TB/B	TB/B	I	M	M	B
26 €	Isard / Spectrum 1,2		24 €	Prowl 400 2 Atic Aqua 1,8	B	B	I	B	M	M
42 €	Camix 3.5				TB/B	TB	M	I	I	TB/B
44 €	Dakota-P 4				TB/B	TB	I	B	M	M
52 €	Calliprime Xtra 0.25 + Isard 1				TB/B	TB	I	I	I	TB/B
40 €	Camix / Calibra 3	+	22 €	Merlin Flexx 1,2	TB/B	TB	M	M	M	TB/B
			18 €	Prowl 1,5	TB/B	TB	I	B	I	B
33 €	Dakota-P 3	+	30 €	Merlin Flexx 1,5	TB/B	TB	M	B	B	B
24 €	Dual Gold / Aliseo 0.9 à 1.3	+	43 €	Adengo / Koloss 1.5	B	B	I	B	B	TB
20 €	Isard / Spectrum 0.8 à 1									

TB : Très Bonne

B : Bonne

M : Moyenne

I : Insuffisante

B Pré-levée puis post-levée

■ Pré-levée = anti graminées. Post-levée = antidicots (+rattrapage anti graminées)

Pré levée			Post levée > 3 F		Flore
32 €	Dual Gold / Aliseo S 1,5 à 2.1 l	puis	12 à 20 €	Callisto 0,3 à 0,5	Dicots classiques 2 à 4 f
24 €	Isard / Spectrum 1 à 1.4 l		18 €	Diode 0.5	
56 €	Isard / Spectrum 1 l + Tarot 50 g		24 €	Laudis WG 0.2 + Actirob B 1	
52 €	Calliprime Xtra 0.25 l + Isard 1 l		22 €	Basamaïs 2	
			37 €	Monsoon Active 1	
			45 €	Souverain OD 1.5	
			19 €	Rajah... 0.8 / Emblem Flo 0.6	
Efficace si pluie ou irrigation d'au moins 10 mm dans les 10 jours suivant l'application					
			35 €	Auxo 0.75 + adjuvant	Dicots diversifiées 4 à 6 f
			26 €	Callisto 0,5 + Peak 6 g	
			33 €	Callisto 0,5 + Biathlon 35g + dash 0.5	
			32 €	Laudis WG 0.2 + Actirob b 1 + Peak 6g	
			29 €	Callisto 0,5 + Cadéli 0,5 / Emblem Flo 0.3	
			30 €	Callisto 0.5 + (Casper 0.1 ou Conquerant 0.2) si liseron	
			29 €	Callisto 0.5 + nicosulfuron 12g	Dicots diversifiées 4 à 6 f + graminées 2 à 3 f
			33 €	Elumis 0.7 + mouillant	
			39 €	Souverain OD / Ducanti OD 1.3	
			35 €	Laudis WG 0.2 + Actirob B 1 + Equip 0.8	
			44 €	Auxo 0.75 + Adjuvant + nicosulfuron 12g	

Efficace si pluie ou irrigation d'au moins 10 mm dans les 10 jours suivant l'application

■ Prélevée complète mais légère. Complément en post-levée selon la flore

Pré levée			Post levée > 3 F		Flore
15 à 20 €		puis	Callisto 0,3 ou Diode 0,5		chénopode amarante
24 €			Laudis WG / Vidal 0.2 + Actirob B 1		
25 / 35 €			Auxo 0.5 à 0.75 + adjuvant		
37 €			Monsoon 1		
12 €			+ (Casper 0.1 ou Conquérant 0.2) si liseron		
49 €		puis	23 € Callisto 0,3 + Cadéli 0,5 / Emblem Flo 0.3		
34 €			20 € Callisto 0,3 + nicosulfuron 12g		
45 €			18 € Callisto 0,3 + Peak 6g		
			34 € Monsoon 0.75 + Cadelli 0.3		
			32 € Auxo / Hydris 0.5 + adjuvant		
Efficace si pluie ou irrigation d'au moins 10 mm dans les 10 jours suivant l'application			13 € nicosulfuron 20g		Graminées
			20 € Callisto 0.3 + nicosulfuron 12g		Graminées + dicots classiques
			22 € Laudis WG 0.2 / Vidal + Actirob B 1 + nicosulfuron 12g		
			20 € Elumis / Choriste 0.4 + mouillant		
			39 € Souverain OD / Ducanti OD 1.3		
			35 € Callisto 0.5 + Stratos Ultra * 0,8 + dash HC 0,8		
			26 € Callisto 0.3+ nicosulfuron 12g + Peak 6		Graminées + dicots diversifiées
			24 € Elumis / Choriste 0.4 + Peak 6		
			60 € Souverain OD / Ducanti OD 1.3 + Casper 0.15		
			30 € Callisto 0.3 + nico 12g + Cadeli 0.5 / Emblem Flo 0.3		
			57 € Monsoon 1 + Laudis 0.2		
			43 € Auxo / Hydris 0.75 + nicosulfuron 12g + adjuvant		
			15 € Binage		

Efficace si pluie ou irrigation d'au moins 10 mm dans les 10 jours suivant l'application

* sur variétés résistantes DUO System

Plutôt une population de dicots : tenter le tout en post-levée

Si la population de graminées est faible ou même inexistante, intervenir uniquement en post levée du maïs et des mauvaises herbes est tout à fait possible. Les conditions climatiques seront bien sûr déterminantes. Deux solutions s'offrent à l'agriculteur : passer rapidement après la levée en misant sur un désherbage unique associant produits

foliaires et produits racinaires (le tout en post précoce) ou désherber classiquement avec des produits foliaires, systémiques ou de contact en un ou deux passages. L'association avec une opération mécanique (herse, houe ou bineuse) est intéressante en cas de faible infestation.

Intervenir en post-levée précoce : une solution séduisante mais délicate

Il s'agit d'intervenir en post-levée très précoce, à 2 feuilles du maïs, sur des adventices non levées ou au stade plantule, avec un désherbage à spectre complet. L'objectif est de gagner en persistance d'action par rapport à un passage de pré-levée, sur graminées et en semis précoces notamment, et, dans la mesure du possible, de ne pas avoir à rattraper. C'est une stratégie séduisante dans le concept mais délicate à mettre en œuvre. Combinant à la fois des herbicides racinaires et

foliaires, elle nécessite des conditions agro-météo favorables aux deux types de produits. En effet, il faut une bonne humidité du sol et une pluviométrie significative après traitement pour optimiser l'action des racinaires mais également intervenir avec une bonne hygrométrie pour garantir l'efficacité des foliaires sur les adventices déjà levées. Noter qu'un rattrapage de post-levée (avec des doses limitées) n'est cependant pas exclu pour contrôler les relevées en cours de cycle.

La post-levée précoce : après une feuille de maïs

Attention : stade maximum des graminées = 2 feuilles

	si dicots classiques		si graminées levées		si dicots diversifiées
30 € 33 € 46 €	Anti graminées + Anti dicots Camix/Calibra 2.5 Dakota-P 3 Adengo/Koloss 1.5	+	8 €	nicosulfuron 12 g	
50 €	Camix/Calibra 1.75 + Elumis/Choriste 0.6				8 € 13 € 9 €
66 € 48 € 59 € 49 €	Adengo/Koloss 1.5 + Isard 0.8 à 1 Camix/Calibra 2 + Merlin Flexx 1.2 Dual Gold 1 + Monsoon / Mondine 1 Isard 0.8 à 1 + Monsoon / Mondine 1				Peak 6g Biathlon 35g + dash 0.5 Emblem Flo 0.25
26 € 25 €	Anti graminées Dual Gold 1.2 Isard 1.1	+	20 € 21 €	Elumis/Choriste 0.4 + mouillant Souverain OD / Ducanti OD 0.7	
			11 € 14 €	Callisto 0.3 Diode 0.5	
			22 €	Auxo/Hydris* 0.5	
			20 €	nicosulfuron 12 g	8 € 13 € 9 €
					Peak 6g Biathlon 35g + dash 0.5 Emblem Flo 0.25

1er traitement

(stade max 2-3 f graminées)

si adventices difficiles

32 €	Callisto 0.5 + nicosulfuron 20g
33 €	Elumis 0.7 + mouillant
39 €	Souverain OD / Ducanti OD 1.3
42 €	Auxo 0.75 + adjuvant + nico 12 g
36 €	Laudis WG 0.2 + Actirob B 1 + nico 20g
39 €	Camix 2.5 + nicosulfuron 12g
37 €	Monsoon / Mondine 1
43 €	Callisto 0.5 + Stratos Ultra* 0,8 + dash 0,8

(1) Le rajout d'un AG racinaire (Dual Gold S 0.8 / Isard

* sur variétés résistantes DUO System

Peak 6g	8 €
Casper 0.1 kg (si liseron)	11 €
Conquérant 0.2 kg (si liseron)	13 €
Rajah...0.5	11 €
Biathlon 35g + dash HC 0.5	13 €

2ème traitement si nécessaire

si adventices difficiles

20 €	Callisto 0.3 + nicosulfuron 12g
20 €	Elumis 0.4 + mouillant
21 €	Souverain OD / Ducanti OD 0.7
32 €	Auxo 0.5 + adjuvant + nico 12g
18 €	Monsoon / Mondine 0.5
35 €	Callisto 0.3 + Stratos Ultra* 0,8 +dash 0.8

* sur variétés résistantes DUO System

Peak 6g	8 €
Casper 0.1 kg (si liseron)	11 €
Conquérant 0.2 kg (si liseron)	13 €
Rajah...0.5	11 €
Biathlon 35g + dash HC 0.5	13 €

15 € Binage

Nicosulfuron 12g = Pampa = Ritmic / Victus = Némé à 0.3 L/ha

= Nisshim Premium 6OD = Milagro Extra 6OD = Pampa Premium 6OD à 0.2l L/ha

* uniquement sur variété tolérante DUO System

Adventices difficiles : renouée liseron, renouée des oiseaux, (mercuriale)...

Elumis / Choriste : non compatible avec bromoxynil poudre WG

Laudis ne se mélange pas avec les bromoxynil

Le binage

Le rattrapage de post-levée peut être réalisé soit par désherbage chimique, soit par binage(s). Les stratégies « combinées », associant intervention chimique et binage(s) procurent des niveaux d'efficacité et de sélectivité proches des stratégies « tout chimique » dans la mesure où les facteurs de réussite sont réunis.

Facteurs de réussite de stratégies combinées, désherbage chimique puis binage

FLORE	- Absence de vivaces. - Levées groupées, pas de levées tardives (attention aux préparations motteuses) - Intervention sur adventices jeunes.
SOL	- Etat de surface affiné, absence d'éléments grossiers en surface. - Terre s'émiettant facilement pour permettre le buttage du rang.
METEO	- Absence ou faibles pluies suite au binage pour éviter les rattrapages.
CULTURE	- Maïs « poussant », fermeture rapide du couvert.
REACTIVITE	- Renouveler le binage si relevées durant la période de sensibilité de la culture (avant fermeture du couvert végétal : levée à 8 feuilles).

RAVAGEURS

Protection contre les ravageurs

PROTECTION DES SEMIS

Des taupins relativement discrets contrairement aux vers gris et à la mouche des semis

Si les taupins sont les ravageurs les plus redoutés par les maïsiculteurs au niveau national, les attaques ont été relativement limitées en 2015. Dans les zones généralement exposées aux plus fortes attaques de taupins (ouest et sud-ouest de la France), les conditions climatiques du printemps ont été plus favorables à l'installation du maïs – pourtant plus ou moins rapides – qu'aux ravageurs. La présence des larves dans les premiers horizons du sol a été rendue difficile par une humidité du sol souvent un peu limitante au cours des périodes à risque.

Le printemps a été plutôt favorable à deux autres ravageurs sur maïs : la mouche des semis et les vers gris. Des dégâts de mouches des semis ont pu être constatés dans des secteurs géographiques ayant été exposés à des conditions très humides fin avril ou début mai suivi de conditions agronomiques et climatiques peu favorables à la levée des maïs. Les parcelles les plus concernées étaient situées en Bretagne. Cette année, la date de semis est un facteur déterminant sur l'intensité des dégâts, en plus des conditions habituellement favorables à ce ravageur (apport ou présence de résidus organiques avant semis). En cas d'incidents agronomiques, climatiques ou de manque de sélectivité des produits, les mouches des

semis ont pu être observées sans pour autant avoir été la cause du problème... Dans ces situations, la protection insecticide n'apporte pas un grand intérêt vis-à-vis de ce type de bioagresseur car la présence de ce dernier n'est que la conséquence d'un accident causé par un autre facteur.

Mais les dommages les plus importants du printemps ont été occasionnés par les vers gris. Certes, les attaques demeuraient souvent localisées mais la fréquence et l'intensité des attaques étaient très importantes dans différentes régions depuis la Lorraine jusqu'au sud-ouest. Dans certains secteurs du centre-ouest de la France, des parcelles ont parfois été totalement détruites obligeant la réalisation d'un nouveau semis. L'intensité des dégâts observés cette année est là aussi le fruit de la conjonction de plusieurs facteurs favorables au bioagresseur avec en particulier des conditions propices à la migration de population (ce phénomène explique également la présence d'autres espèces de lépidoptères également visibles dans certains secteurs de France) et des conditions climatiques dépourvues d'excès de pluviométrie à partir de début mai, condition favorable à la survie des jeunes larves issues des pontes déposées au sol par les papillons.


La gamme de produits insecticide continue de s'étoffer

Les solutions de protection insecticide des semis ont été globalement satisfaisantes dans les conditions d'attaques modérées par les taupins en 2015. Les efficacités des produits oscillent entre 50 et 70% selon les conditions d'application et la dynamique d'attaque des taupins. Les solutions à base de pyréthrianoïdes en microgranulés apportent des niveaux de protection comparables entre elles partout en France, sauf dans les essais réalisés en Bretagne où le Force 1,5G confirme son intérêt supérieur par rapport aux autres solutions.


Pour les prochains semis, de nouvelles solutions à base de lambda-cyhalothrine (famille des pyréthrianoïdes)

viendront compléter la panoplie des solutions microgranulés déjà sur le marché (Force 1,5G, Belem 0.8Mg, Fury Géo) : il s'agit des produits Karaté 0.4Gr (homologué depuis fin 2015) et Trika Expert (en attente d'une homologation). En cas d'attaques précoces par les taupins, le traitement de semences Sonido apporte un niveau de protection équivalent aux microgranulés. En revanche, l'efficacité de ce traitement de semence décroît lorsque les attaques de taupins s'intensifient après le stade 6 feuilles du maïs. Les expérimentations conduites en 2015 confirment le manque de pertinence de la double protection associant un traitement de semence à un produit en microgranulés.

Synthèse de 14 essais - maïs grain, maïs fourrage 2011-2015



Synthèse de 3 essais Sud Aquitaine - maïs grain 2013-2015



Etre proactif pour éviter les attaques de gris

Les microgranulés à base de pyréthrinoides apportent un réel bénéfice pour la protection contre les attaques précoces de vers gris. En cas d'attaque tardive des vers gris par rapport à la date de semis, ce type de protection ne suffit pas et seule l'application d'un produit insecticide en végétation peut permettre d'endiguer l'attaque à condition que celle-ci soit détectée suffisamment tôt pour que l'insecticide soit appliqué avant que les plantes ne soient détruites (!) et avant que les larves ne soient trop développées. En effet, l'action de contact de l'insecticide est vite mise en défaut lorsque la larve atteint un stade de développement plus avancé. L'application de méthiocarbe pour lutter contre les limaces pouvait permettre de contenir une attaque de vers gris grâce à

l'action par ingestion des granulés appâts par les larves. Ces produits (gamme Mesurol sur appâts) ne sont plus disponibles sur le marché et les autres granulés appâts molluscicides ne présentent pas d'intérêt pour lutter contre les larves de vers gris. Il est donc encore plus nécessaire d'intensifier la surveillance en début d'attaque de vers gris pour réaliser une lutte sur jeunes larves, seuls stades auxquels la lutte peut apporter une satisfaction. Il est conseillé d'intervenir en fin de journée au moment où les larves ont une activité en surface du sol (alors que leur activité reste essentiellement sous la surface du sol lorsque les conditions sont chaudes et sèches) et avec un fort volume de bouillie pour augmenter l'efficacité.

Corvidés : des dégâts plutôt limités en 2015

Les oiseaux provoquant le plus de dégâts sur les semis de maïs sont des corvidés (Source : Enquête dégâts d'oiseaux en grandes cultures, récolte 2009). Deux principales espèces sont identifiées, la corneille noire, espèce sédentaire et territoriale à bec noir et le corbeau freux, reconnaissable par son bec blanc grisâtre, qui se comporte aussi bien comme un oiseau migrateur que comme un oiseau sédentaire. Ces corbeaux consomment les graines de maïs depuis la germination et généralement jusqu'au stade 4-5 feuilles. Les attaques peuvent exceptionnellement se poursuivre jusqu'au stade 7-8 feuilles certaines années. En suivant la ligne de semis, les corbeaux peuvent provoquer des dégâts importants pouvant conduire à un resemis.



Corneille noire

Les corbeaux sont fortement présents dans les vallées avec des refuges à proximité (bois, grands arbres, nidification dans les parcs...). Ils n'apprécient pas d'être dérangés. Ainsi les parcelles les plus à risques sont celles où la présence humaine est moindre (grandes parcelles, parcelles en hauteur avec vue dégagée, parcelles isolées).



Dégâts de corbeaux sur maïs

La présence des corbeaux dans un secteur géographique est souvent peu maîtrisable mais certains facteurs peuvent permettre de limiter – dans une certaine mesure - les dégâts qu'ils occasionnent aux cultures. Un secteur avec seulement quelques parcelles de maïs semées est davantage exposé qu'un autre secteur où les semis seraient simultanés sur de larges surfaces (dilution de l'offre). C'est pourquoi les parcelles de maïs situées dans des régions où cette culture est minoritaire sont souvent attaquées. Dans la mesure du possible, il est préférable de ne pas semer ses parcelles trop en décalé - c'est-à-dire trop précocement ou trop

tardivement - par rapport à l'environnement proche. Le semis superficiel (2-3 cm) est aussi une pratique à risque favorisant la préhension des graines, il est préférable de respecter une profondeur de semis de 4 à 5 cm. Un lit de semence trop motteux avec présence de nombreux résidus peut aussi faciliter les déprédations de plantules par les corbeaux. La biologie du ravageur est également déterminante : l'intensité des attaques est fortement liée à la coïncidence entre les besoins alimentaires de ces volatils et l'offre alimentaire que représentent les semis de maïs.

Facteurs favorables	Facteurs défavorables
- Semis décalés (précoces, tardifs) - Présence de résidus en surface (couvert végétaux, graines...) - Sol motteux - Vitesse de levée lente	- Semis simultanés dans un même secteur géographique - Roulage du lit de semence - Profondeur de semis adaptée (4-5 cm) - Passage humain régulier sur la parcelle

De nombreux systèmes d'effaroucheurs existent (épouvantails, canons...). Leur efficacité peut parfois être décevante suite à une accoutumance souvent rapide des oiseaux. Un passage humain régulier reste souvent le plus efficace pour éviter une installation des corbeaux dans la parcelle.


Dans les secteurs régulièrement affectés, les déclarations des dégâts chaque année peut permettre la mise en place d'un plan de régulation des populations. Le piégeage d'individus grâce à des cages – qui nécessite d'obtenir l'agrément piégeur - permet de réguler les populations et réduire ainsi les dégâts.

Des traitements de semences sont disponibles sur le marché pour un usage répulsifs corbeaux. Ces

spécialités chimiques autorisées appartiennent à la famille des carbamates. Ces solutions ont été testées sur plusieurs années. Dans le cas d'une attaque forte (seulement 20% de plantes présentes dans les témoins), le produit Korit 420 FS (à base de zirame, 250 g SA/q) présente une efficacité légèrement mieux que la référence Gustafson 42S (à base de thirame, 160 g SA/q). En cas de très fortes attaques, les solutions chimiques ne présentent pas une efficacité satisfaisante et évitent rarement de devoir procéder à un nouveau semis. Dans ces situations, seule la modification de l'itinéraire technique et la régulation des populations de freux et/ou corneilles dans l'environnement proche de la parcelle peuvent permettre de diminuer les risques pour la culture.

Protection du maïs contre les corvidés : résultats d'expérimentations

8 essais réalisés au champ
(7 essais avec corneilles noires, 1 essai avec freux)
(2011 - 2015)



Lutte contre les ravageurs au stade jeune : Quelle protection choisir ?

Spécialités commerciales (produit de référence)	SONIDO	FORCE 20CS	FORCE 1,5G (12,24 kg)	BELEM 0.8MG (15 kg)	FURY GEO (15 kg)	KARATE 0.4GR (10 kg)
Type de produit	Traitement de semences		Microgranulés appliqués avec un diffuseur			
Diffuseur recommandé	Non concerné		Diffuseur Syngenta	Diffuseur DXP	Tous diffuseurs	Diffuseur Syngenta
Conditions d'application optimales	Pour un positionnement optimal des microgranulés, éviter les préparations grossières (avec motes, cailloux, résidus, lit de semence soufflé, sol trop sec...)					
Homologues pour les usages :	Ravageurs du sol, mouches	Ravageurs du sol				
Intrinsèques techniques pour la protection contre :	Taupins					
	Scutigerelle					
	Vers gris					
	Mouche des semis					
	Oscinè Génomys					
	Pucerons, cicadelles au stade jeune					
Principales contraintes réglementaires	Densité max. de semis : 110 000 gr/ha	Autorisé une année sur trois			ZNT 20 m Dispositif végétalisé permanent de 20 m	ZNT 20 m Dispositif végétalisé permanent de 20 m
Prix indicatif / Ha (dose homologuée)	50 à 70 € selon densité de semis	30 à 40 € selon densité de semis	-65-70 €	-44-46 €	-58-60 €	-63-65 €

Légendes :

Usage homologué

Usage non homologué pour lutter contre la cible

Efficacité :

++ Bonne

+ Moyenne

+/- Irrégulière

- Insuffisante

? Manque d'information

① Efficacité plus limitée en cas d'attaques tardives. Meilleure efficacité lors d'attaques précoces

② Protection insecticide à accompagner de mesures agronomiques adaptées

* à confirmer

▲ La firme phytopharmaceutique ne conseille pas l'utilisation du produit pour protéger la culture contre la cible. Le produit peut être appliqué sous la responsabilité de l'agriculteur.

Les appréciations concernant les efficacités sont renseignées à titre indicatif.

Protection du maïs contre les larves de lépidoptères :

Traitement en période de floraison :

La réalisation de traitement en période de floraison est à ce jour autorisée. Afin d'accompagner les producteurs dans la mise en œuvre de ces traitements, des fiches de bonnes pratiques ont été rédigées. Celles-ci visent notamment à rappeler les principes importants permettant de respecter les pollinisateurs tout en maintenant la possibilité d'appliquer des produits insecticides à un stade permettant de bénéficier d'une efficacité optimale. Les fiches de bonnes pratiques de traitement en période de floraison du maïs peuvent être téléchargées sur le site d'Arvalis.

LES CAPTURES DE CHRYSOMELES DU MAÏS DEMEURENT LIMITEES EN 2015

Même si la chrysomèle du maïs ne fait l'objet d'aucune réglementation en France depuis 2014, ce ravageur continue de faire l'objet de suivis dans les différentes

régions grâce à d'importants réseaux de surveillance. Les captures réalisées en 2015 s'inscrivent dans la continuité des années précédentes.

Alsace et en Rhône-Alpes : De larges secteurs concernés par des populations globalement encore peu abondantes

Sur les 135 pièges qui ont été suivis en Alsace durant l'été 2015, environ un tiers a détecté la présence de l'insecte. Le total des captures s'élève à 1249 individus dont 487 captures dans une seule parcelle.

En Rhône-Alpes, 93 pièges ont été suivis et ont totalisé 1206 captures. Là aussi, le chiffre total est largement influencé par une seule parcelle où 678 individus ont été capturés. Sur l'ensemble de la région, environ la moitié des pièges à capturé au moins un individu.

Ces résultats confirment que la chrysomèle du maïs est présente sur de vastes zones maïsicoles dans ces deux régions. Le niveau de population est cependant maintenu très largement en dessous du seuil susceptible d'occasionner une nuisibilité économique pour la culture du maïs.

Pour l'année prochaine, il sera recommandé de poursuivre les mesures de lutte déjà mises en œuvre

depuis plusieurs années avec notamment la rotation progressive des cultures de maïs (un an sur six). La rotation doit être mise en œuvre en priorité dans les parcelles ayant fait l'objet des plus forts niveaux de captures (et dans les parcelles adjacentes si la taille des parcelles est réduite) afin de limiter une augmentation rapide de population.

Très calme dans les autres régions...

La chrysomèle du maïs avait été détectée dans d'autres régions de France au cours des deux dernières années (PACA, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Auvergne, Picardie, Midi-Pyrénées). Aucune capture n'a été signalée dans ces régions en 2015.

Par contre, un nouveau foyer a été détecté dans le sud de l'Aquitaine. S'agissant de captures nouvelles (les

environs étaient surveillés depuis plusieurs années et aucun piège n'avait capturé antérieurement), localisées et en faibles nombres (7 adultes), il est recommandé aux agriculteurs de ne pas implanter de maïs au printemps 2016 dans les parcelles où des individus ont été capturés ainsi que dans les parcelles adjacentes.

Recommandations générales pour limiter le développement des populations

La surveillance de la chrysomèle du maïs constitue un socle sur lequel reposent les recommandations techniques de lutte. La surveillance de la chrysomèle du maïs n'est plus une source potentielle de contraintes réglementaires, mais devient un outil au service des agriculteurs permettant de définir les recommandations techniques en fonction du niveau de risque.

Conformément aux recommandations formulées par la Commission Européenne, l'objectif est de fournir des conseils techniques permettant de réduire la densité de population de l'organisme nuisible à un niveau n'entraînant pas de pertes économiques significatives. Ces conseils seront adaptés en fonction des niveaux de population observés dans le secteur géographique et les caractéristiques des parcelles de la zone considérée (historique maïs, itinéraire technique). Les moyens de lutte à déployer devront être à l'échelle de la parcelle, en fonction des risques auxquels celle-ci est exposée. Compte tenu des connaissances actuelles, les facteurs connus influençant fortement la nuisibilité de la chrysomèle du maïs sont l'assolement (succession maïs – maïs favorable au ravageur) et le stress hydrique pendant la période estivale (un stress hydrique prononcé entraîne une forte nuisibilité). Les autres facteurs agronomiques – protection insecticide contre les larves – présentent un intérêt technique ou économique plus limité par rapport aux objectifs poursuivis lorsque les niveaux de population sont faibles. L'intérêt de ces techniques pourra être pris en considération dans les situations où les populations seront importantes (situations non décelées à ce jour sur le territoire).

Dans un premier temps, les recommandations techniques porteront donc uniquement sur l'assolement, avec la rupture de la succession de maïs selon un rythme qui sera ajusté en fonction du niveau de la population du ravageur et de l'exposition au stress hydrique de la parcelle. Ces recommandations feront l'objet d'améliorations et d'ajustements au fil des années en fonction de l'approfondissement des connaissances concernant la nuisibilité de la chrysomèle du maïs dans les différents contextes maïsicoles français.

Dans les secteurs où la chrysomèle du maïs a pu être détectée ponctuellement, il est recommandé de ne pas semer de maïs au cours du printemps dans les parcelles où des adultes de chrysomèle du maïs ont été capturés l'année précédente - ainsi que dans les parcelles voisines - afin de retarder l'installation du ravageur dans ce secteur.

Lorsque la chrysomèle du maïs n'a pas été détectée dans un secteur géographique, les parcelles de maïs exposées à un risque d'introduction d'adultes du ravageur - parcelles situées à proximité immédiate d'une aire de stationnement, d'une zone industrielle avec trafic routier, ferroviaire ou aéroportuaire, d'une zone touristique... - devront faire l'objet d'une attention particulière (maïs en rotation ou surveillance à l'aide de pièges à phéromone).

**Proposition de recommandations techniques pour le maïs grain et le maïs fourrage
en fonction du niveau de captures de chrysomèle du maïs :**


en fonction du niveau de captures de chrysomèle du maïs :

Risque de nuisibilité de la chrysomèle du maïs		Pas de capture	Faibles captures sur pièges à phéromone <100 ad./piège/an	Captures significatives sur pièges à phéromones >100 ad./piège/an	Changement de piège [seuil à définir]	Faibles captures sur pièges jaunes <5 ad./piège/jour <i>Seuil à définir</i>	Captures significatives sur pièges jaunes >5 ad./piège/jour <i>Seuil à définir</i>
+	Stress hydrique faible	Pas de recommandation concernant l'ITK <i>Surveillance</i>	Pas de semis de maïs au printemps de l'année n+1 dans la parcelle où les premiers individus ont été capturés en année n (et dans les parcelles contiguës cultivées en maïs l'année n) <i>Surveillance des parcelles voisines en année n+1</i>	Pas de maïs 1 an sur 6		Pas de maïs 1 an sur 4	Pas de maïs l'année suivante
	Stress hydrique fort			Pas de maïs 1 an sur 5		Pas de maïs 1 an sur 3	Pas de maïs l'année suivante
Mise en œuvre des recommandations à l'échelle :		Territoire	Petite région agricole (= segment)				Parcelle

ITK = Itinéraire technique / Ad. : adultes

/ En italique : surveillance

Version : Novembre 2015



ARVALIS
Institut du végétal

3 rue Joseph et Marie Hackin
75116 Paris
Tél. 01 44 31 10 00
Fax 01 44 31 10 10
www.arvalisinstitutduvegetal.fr

membre de :

